

Gastroscoopie/Duodenoscopie bij de klinische patiënt

Uw behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van binnen wordt onderzocht. Dit onderzoek (gastroscoopie) gebeurt op het behandelcentrum van ZGT.

In deze folder vertellen wij u meer over de gang van zaken rondom de gastroscoopie.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een gastroscoopie op het behandelcentrum. De afspraak is gepland op:

Dag:

Datum:

Tijd:

Specialist:.....

Midazolam sedatie/Propofol sedatie

Een sedatie is niet standaard voor een gastroscoopie. Mocht de specialist toch beslissen dat de gastroscoopie onder sedatie mag plaatsvinden, dan is afhankelijk van de beslissing van de specialist, welke sedatie u krijgt.

Een gastroscoopie kan plaatsvinden onder twee soorten sedatie, namelijk onder Midazolam sedatie (lichte roes) of onder Propofol sedatie (matige diepe sedatie). Bij een Propofol sedatie zult u voorafgaand aan de gastroscoopie naar de pre-operatieve screening (POS) moeten.

U krijgt tijdens het onderzoek de volgende sedatie;

- Geen sedatie
- Midazolam sedatie
- Propofol sedatie

Voorbereidingen

- De dag van het onderzoek mag u vanaf 's nachts 00:00 uur niet meer eten of drinken.
- Als het onderzoek 's middags na 13.00 uur plaatsvindt mag u nog een licht ontbijt (een naturel beschuit met een kopje thee). Bij propofolsedatie mag u dit ontbijt nuttigen tot 6 uur voor het onderzoek. Bij Midazolamsedatie mag u dit ontbijt nuttigen tot 4 uur voor het onderzoek.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Vertel uw behandelend specialist of verpleegkundig specialist of u medicijnen gebruikt, allergisch bent, een longziekte hebt, zwanger bent of ooit aan de maag geopereerd bent;
- U kunt uw medicijnen gewoon blijven innemen, tenzij anders met u is afgesproken;

Het onderzoek

U wordt door een verpleegkundige of gastheer of -dame naar het behandelcentrum gebracht.

In de behandelkamer wordt u verzocht om eventuele gebitsprothese en/of bril te verwijderen.

Zo nodig krijgt u een naaldje in de hand /arm waardoor de eventuele sedatie zal worden toegediend. Uw hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in uw bloed worden door bewakingsapparatuur in de gaten gehouden. Daarna wordt u verzocht om op uw linker zij te gaan liggen.

Vervolgens wordt via de mond het slangetje ingebracht, waardoor de arts de binnenkant van uw maag kan bekijken. In sommige gevallen wordt een klein stukje weefsel op pijnloze wijze uit de maagwand genomen. Soms kan tijdens het onderzoek een behandeling worden gedaan. Dit is meestal voor het begin van het onderzoek bekend en u zult hiervan reeds op de hoogte zijn. Ter voorkoming van onnodige afbreking en herhaling van het onderzoek, gaan we ervan uit dat u hiervoor toestemming geeft. Indien dit niet het geval is, gelieve dit van te voren kenbaar te maken. De specialist zal deze ingreep na afloop van het onderzoek met u bespreken.

Duur van het onderzoek

Het gehele onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Na afloop van het onderzoek

Als u terug bent op de afdeling dan zal de arts/arts-assistent u een voorlopige uitslag van het onderzoek geven. De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of behandeling wordt geadviseerd. Uw arts/arts-assistent zal dit dan ook met u bespreken. Mocht er sedatie gegeven zijn, dan zal de verpleegkundige pols en bloeddruk en saturatie controle uitvoeren, bij terugkomst op de afdeling.

Complicaties

Tijdens het onderzoek is er een minimale kans dat er in de slokdarm of maag een gaatje (perforatie) ontstaat. Met name is deze kans aanwezig indien een vernauwing moet worden opgerekt. Indien deze complicatie zich voordoet, kan deze vaak zonder operatie worden behandeld. U zult hiervoor dan wel opgenomen blijven.

Medicatie

Indien u medicijnen gebruikt mag u deze tot vier uur voor het onderzoek nog innemen. Soms worden tijdens de gastroscopie kleine ingrepen verricht, zoals het wegnemen van een stukje weefsel voor biopsie. Als u bloed verdunnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. In overleg met de specialist/arts-assistent zal dit eventueel worden aangepast. Na het onderzoek hoort u van de arts/arts-assistent, wanneer u weer mag starten met de bloedverdunnende medicijnen.

Bent u diabeet en gebruikt u hiervoor medicatie of insuline ook dan krijgt u van de arts/arts-assistent hierover een advies.

Begeleiding na sedatie

Mocht u sedatie hebben gehad en gaat u dezelfde dag, na de gastroscopie, nog met ontslag, dan geldt onderstaande voor u:

- Voor zowel Midazolam sedatie als voor Propofol sedatie geldt; u mag na de behandeling/het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis. LET OP; Als dit niet geregeld is kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan!
- Bij Midazolam sedatie; U mag tot 24 uur na de sedatie niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, dus ook geen auto rijden, niet zelfstandige gebruik maken van het openbaar vervoer. Neem deze dag geen belangrijke beslissingen. U kunt vergeetachtig zijn.
- Bij Propofol sedatie; zie voor informatie over begeleiding in middag, avond en nacht, deelname aan het verkeer, werken, alcoholgebruik de patiëntenfolder '*sedatie en/of analgesie tijdens onderzoek of behandeling*'. Deze krijgt u tijdens de pre-operatieve screenings afspraak bij de afdeling opname, planning en anesthesie.

Hulp/gezelschap

Indien u na het onderzoek naar huis gaat mag u, in verband met het uitwerken van de sedatie, niet alleen thuis zijn. Zorgt u daarom voor begeleiding voor de middag en avond. Mocht u propofolsedatie hebben gehad dan mag u ook de nacht na het onderzoek niet alleen thuis zijn.

Patiëntveiligheid

ZGT ziet patiëntveiligheid als een vanzelfsprekende basis voor goede zorg en dienstverlening. Verschillende zorgverleners vragen daarom uw naam, geboortedatum en voor welke operatie of ingreep u komt. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze controle is voor uw veiligheid.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Complicaties komen bij dit onderzoek heel zelden voor. Wanneer u echter na afloop van

het onderzoek toenemende pijn of koorts krijgt of bloed moet opgeven dan kunt u bellen naar het ziekenhuis en vragen naar de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Vanaf de volgende ochtend belt u bij problemen het MDL-centrum. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 088 708 70 70.

Vragen

Stel deze gerust aan de verpleegkundige, arts en/of arts-assistent.