

Coloscopie met Klean-prep voorbereiding bij matige en diepe sedatie (Propofol)

Uw huisarts of behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat uw dikke darm of een gedeelte daarvan van binnen wordt onderzocht. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, over de gang van zaken tijdens uw bezoek aan ZGT, en over de afdeling dagopname. Het onderzoek (coloscopie) vindt plaats in het behandelcentrum en wordt uitgevoerd onder matige tot diepe sedatie.

De afspraak

Uw afspraak voor een colonoscopie bij het behandelcentrum is gepland op:

Dag:

Datum:

Specialist:

Tijd:

Melden om:

verkrijgt. Klean-prep en bisacodyl dient u volgens de gebruiksaanwijzing te gebruiken.

Indien de darm niet goed gereinigd is, dan wordt het onderzoek afgebroken. Het onderzoek wordt dan op een later tijdstip herhaald.

Indien u een stoma heeft, dan krijgt u daarbij extra informatie en stomamateriaal.

Door het gebruik van laxeremiddelen bestaat de kans op eventuele onwelwording. Houdt u hier rekening mee.

Melden

Op de dag van de afspraak wordt u verwacht;

- Ziekenhuislocatie Almelo, bij de dagopname, routenummer 1.4

De coloscopie gaat plaatsvinden onder matige en diepe sedatie (Propofol). Bij Propofol sedatie moet u voorafgaand aan de coloscopie naar de pre-operatieve screening (POS). Deze screening is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of deze vorm van sedatie veilig gegeven kan worden.

Vorbereidingen

Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de gehele darm is gereinigd. Hiervoor krijgt u een recept mee van de verpleegkundige of. Dit recept levert u in bij uw eigen apotheek waar u het laxeremiddel Klean-prep en bisacodyl

Twee dagen voor het onderzoek:

- Normaal eten en drinken. Geen zaden, nootjes, pinda's en pitjes nuttigen, zoals volkoren brood, sesam- en maanzaadjes, kiwi, aardbeien(jam), tomaat, druiven etc.
- Voor het slapen gaan neemt u 2 tabletten Bisacodyl.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

○ **Onderzoek gepland in de ochtend**

Dag voor het onderzoek

Ontbijt	Wit brood met kaas of ham. Geen brood met pitjes of vezels. Alleen heldere dranken zoals thee, water, ranja en heldere appelsap, heldere frisdranken zonder koolzuur, bouillon. Geen melkproducten en geen koffie.
09.00-11.00	U maakt uw eerste Klean-Prep drank klaar. Doe de inhoud van het zakje direct in de 'shaker'. Deze heeft u bij de apotheek ontvangen. Eén liter water toevoegen (zie zijkant etiket shaker). Deksel op de shaker en goed schudden tot de Klean-Prep volledig is opgelost. Deze drank drinkt u in één uur tijd op. Deze procedure herhaalt u één keer. Door dit gebruik van Klean-Prep krijgt u flinke diarree. Dit is heel hinderlijk voor u maar wel noodzakelijk voor het onderzoek.
Lunch	Zie ontbijt
17.00	Neem een lichte of helder vloeibare maaltijd, zoals naturel beschuit en/of bouillon.
20.00-22.00	U maakt de Klean-Prep drank klaar zoals hiervoor is omschreven. Dit drankje drinkt u in één uur tijd op. Deze procedure herhaalt u één keer.
Na 22.00 uur	Rustperiode. In deze periode mag u nog wel bovenstaande heldere vloeistoffen gebruiken. U mag vanaf 24.00 uur niet meer roken. Voor het slapen gaan neemt u 2 tabletten bisacodyl.

Dag van het onderzoek

<p>U mag niet meer eten.</p> <p>Tot 2 uur voor het onderzoek mag u nog kleine hoeveelheden heldere vloeistoffen drinken zoals water, thee, ranja, heldere appelsap, heldere frisdranken zonder koolzuur, bouillon. Wanneer er ook een maagonderzoek is gepland mag u 4 uur voor het onderzoek niet meer drinken.</p> <p>Het is de bedoeling dat u ontlasting een heldere, lichte kleur heeft. Mocht dit niet zo zijn, dan is het aan te raden extra water te drinken, tot maximaal 2 uur voor het onderzoek.</p>
--

○ **Onderzoek gepland in de middag**

Dag voor het onderzoek

Ontbijt	Wit brood met kaas of ham. Geen brood met pitjes of vezels. Alleen heldere dranken zoals thee, water, ranja en heldere appelsap. Geen melkproducten en geen koffie.
Lunch	Zie ontbijt.
17.00	Neem een lichte of helder vloeibare maaltijd, zoals naturel beschuit en/of bouillon.
19.00 tot 21.00 uur	U maakt uw eerste Klean-Prep drank klaar. Doe de inhoud van het zakje direct in de 'shaker'. Deze heeft u bij de apotheek ontvangen. Eén liter water toevoegen (zie zijkant etiket shaker). Deksel op de shaker en goed schudden tot de Klean-Prep volledig is opgelost. Deze drank drinkt u in één uur tijd op. Deze procedure herhaalt u één keer. Door dit gebruik van Klean-Prep krijgt u flinke diarree. Dit is heel hinderlijk voor u maar wel noodzakelijk voor het onderzoek.
Na 22.00 uur	Rustperiode. In deze periode mag u nog wel bovenstaande heldere vloeistoffen gebruiken. U mag vanaf 24.00 uur niet meer roken. Voor het slapen gaan neemt u 2 tabletten bisacodyl.

Dag van het onderzoek

Ontbijt	Licht ontbijt (een naturel beschuit met een kopje thee) U mag dit ontbijt nuttigen tot 6 uur voor het onderzoek.
08.00-10.00 uur	U maakt de Klean-Prep drank klaar zoals hiervoor is omschreven. Dit drankje drinkt u in één uur tijd op. Deze procedure herhaalt u één keer. U mag niets meer eten In deze periode mag u nog wel heldere vloeistoffen blijven gebruiken tot 2 uur voor het onderzoek. Staat u ook voor een maagonderzoek gepland? Dan moet u 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Het is de bedoeling dat uw ontlasting een heldere, licht gele, kleur heeft. Mocht dit niet zo zijn dan is het aan te raden extra water te drinken, tot maximaal 2 uur voor het onderzoek.

Verloop van het onderzoek

Voordat de specialist / physician assistant (PA) begint met het onderzoek krijgt u op de dagopname een infuus in uw hand of arm. Voordat u de sedatiemiddelen toegediend krijgt, wordt bewakingsapparatuur aangesloten; de sedatie praktijk specialist bewaakt uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed. Ten slotte krijgt u zuurstof toegediend en wordt uw ademhaling nauwlettend in de gaten gehouden.

Het onderzoek wordt op uw linkerzij uitgevoerd en u heeft daarbij uw knieën opgetrokken. De beweegbare kijker (endoscoop) wordt via de anus ingebracht tot aan de overgang van de dikke naar de dunne darm.

Tijdens het terugtrekken van de scoop wordt de darm goed bekeken. Soms worden tijdens het onderzoek één of meerdere poliepen aangetroffen. Deze kunnen meestal direct en pijnloos worden verwijderd.

Toestemming verwijderen weefsel

Omdat u een lichte verdoving hebt gekregen, kunnen we u geen toestemming vragen om poliepen/stukjes weefsel direct te verwijderen. Ter voorkoming van onnodige afbreking en herhaling van het onderzoek gaan we ervan uit dat u hiervoor toestemming geeft. Indien dit niet het geval is, maakt u dit dan van te voren kenbaar.

Wanneer de colonoscopie is uitgevoerd blijft u nog enige tijd op de afdeling om uit te slapen. Soms is het echter nodig dat u na verwijdering van een poliep ter controle een nacht wordt opgenomen. In principe mag u dan de volgende dag weer naar huis. Het hele onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten. De tijd dat u in het ziekenhuis bent is aanmerkelijk langer in verband met de voorbereiding en de nazorg.

Na afloop van het onderzoek

Als de behandelend arts klaar is met de ingreep, wordt gestopt met het toedienen van de sedatie. U wordt snel wakker. Na de ingreep wordt u naar de dagverpleging gebracht, waar u in de gaten gehouden wordt.

Als u volledig wakker bent komt de arts altijd even bij u om u een voorlopige uitslag van het onderzoek te geven. Het is wenselijk dat er iemand (familielid of anderszins) meeluistert met deze uitslag. Dit omdat u door de sedatie niet alles meekrijgt en/of onthoudt.

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en bespreekt dit met u. De uitslag van de weefselstukjes duurt enkele dagen. Het kan zijn dat nader onderzoek of behandeling wordt geadviseerd. Uw arts zal dit dan ook met u bespreken.

Na het onderzoek kunt u door de ingeblazen lucht wat krampende pijn ervaren. Deze pijn verdwijnt als u deze lucht kwijtraakt, door winden te laten.

Wanneer er een stukje weefsel is weggenomen kan enig bloedverlies optreden. Dit is normaal.

Het is mogelijk dat het enige dagen duurt voordat u weer ontlasting heeft.

U krijgt na het onderzoek een broodje en drinken aangeboden op de dagopname.

Complicaties

Tijdens het onderzoek bestaat een zeer klein risico tot het ontstaan van complicaties. Dit kan een gaatje in de darm (perforatie) en/of een bloeding zijn. De bloeding en perforatie kan meestal direct en plaatselijk worden behandeld. Indien zich een perforatie heeft voorgedaan en deze kan niet direct worden gesloten, is af en toe een operatie noodzakelijk en wordt u direct opgenomen in het ziekenhuis. Deze complicaties kunnen direct tijdens het onderzoek, maar ook één tot veertien dagen erna optreden. Klachten

die u hiervan zou kunnen krijgen zijn buikpijn en later koorts.

Medicatie

Soms worden tijdens de coloscopie kleine ingrepen verricht, zoals het wegnemen van een poliep of een stukje weefsel voor biopsie. Als u bloedverdünnende middelen gebruikt kan een langdurige bloeding optreden. In overleg met de verpleegkundig / specialist zal dit eventueel worden aangepast.

Na het onderzoek hoort u van de specialist / PA die het onderzoek verricht heeft, wanneer u weer mag starten met de bloedverdünnende medicijnen. Indien u medicijnen gebruikt wordt met u besproken of u deze medicijnen de ochtend van het onderzoek wel moet innemen.

Bent u diabeet en gebruikt u hiervoor medicatie of insuline ook dán krijgt u van de verpleegkundig / specialist hierover een advies.

Neemt u de medicatie voor de diabetes, zoals de tabletten en/of de insulinepen mee naar het ziekenhuis.

Het is verstandig altijd een lijstje bij u te hebben met medicijnen die u regelmatig inneemt.

Begeleiding na sedatie

- U mag na de behandeling/het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis, Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis. LET OP; Als dit niet geregeld is kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan!
- Zie voor informatie over begeleiding in middag, avond en nacht, deelname aan het verkeer, werken, alcoholgebruik de patiëntenfolder '*Sedatie en/of analgesie tijdens onderzoek of behandeling*'. Deze krijgt u tijdens de POS afspraak.

Dagopname

Dag van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich in ziekenhuislocatie Almelo op de dagopname, route 1.4.

Dagopname wil zeggen dat een patiënt 's morgens of 's middags naar het ziekenhuis komt en in de meeste gevallen in de loop van de dag weer naar huis gaat.

Vorbereiding thuis

- Make-up dient u voor uw komst te verwijderen.
- Draag prettige en warme kleding. U kunt het tijdens de voorbereiding namelijk koud krijgen.
- U mag na de behandeling / het onderzoek niet zonder begeleiding naar huis. Zorg dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis of dat iemand u ophaalt na de behandeling. LET OP; als dit niet geregeld is, kan het onderzoek of de behandeling helaas niet doorgaan.
- Na het onderzoek raden we u aan licht-verteerbare voeding tot u te nemen.

Wat neemt u mee voor de dagopname?

- De medicijnen die u gebruikt.
- Eventueel uw toiletbenodigdheden o.a. kam, slippers, één stel ondergoed, tandenborstel en tandpasta.
- Eventueel iets om te lezen.

Wat neemt u niet mee?

Wij verzoeken u geen sieraden, geld of andere waardevolle zaken mee te nemen naar het ziekenhuis.

Patiëntveiligheid

ZGT ziet patiëntveiligheid als een vanzelfsprekende basis voor goede zorg en dienstverlening. Verschillende zorgverleners vragen daarom uw naam, geboortedatum en voor welke operatie of ingreep u komt. Dit gebeurt meerdere keren achter elkaar. Deze controle is voor uw veiligheid.

Wat gebeurt er op de afdeling dagopname?

Op de dagopname wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u en uw eventuele begeleider het tijdstip waarop u naar huis mag. Vervolgens vindt controle van uw temperatuur, pols en bloeddruk plaats. Er worden gegevens verzameld en u zult een infuusnaaldje krijgen. Dit gebeurt voordat u naar de onderzoekskamer wordt gebracht. Voor de patiënten in Almelo geldt; De begeleider mag voordien mee naar de patiëntenkamer, hier wordt door de verpleegkundige concrete afspraken gemaakt met de begeleiding voor/over het ophalen van de patiënt.

Belangrijk!

Zorg voor een contactadres/telefoonnummer tijdens uw korte verblijf in het ziekenhuis. Op de dagopname bestaat geen mogelijkheid bezoek te ontvangen van uw familie of bekenden. Zorg er voor dat er iemand in huis is als u thuis komt.

Het onderzoek

U krijgt een bed toegewezen op de dagopname. Wanneer u naar de onderzoekskamer gaat moet u zich ontdoen van uw onderkleding. De arts geeft u via de

infuusnaald een slaapmiddel en een pijnstillert. Hierna volgt het onderzoek. Na het onderzoek komt u weer terug op de patiëntenkamer, hier kunt u uitslapen en krijgt u een broodje en drinken aangeboden.

Uitslag

De specialist/PA komt bij u langs voordat u naar huis gaat. U hoort dan de eerste bevindingen.

Nazorg

U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer na het onderzoek i.v.m. de toegediende sedatiemiddelen. (zie ook de verzekeringsvoorwaarden in uw WA en/of verkeerspolis). Laat u daarom begeleiden door een familielid/kennis.

Neem deze dag geen belangrijke beslissingen. U kunt vergeetachtig zijn.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

Complicaties komen bij dit onderzoek heel zelden voor. Hebt u na afloop van het onderzoek buikpijn, koorts en/of bloedverlies? Bel dan naar het ziekenhuis telefoonnummer 088 708 78 78 en vraag naar de afdeling spoedeisende hulp.

Vanaf de volgende ochtend belt u bij problemen het MDL-centrum. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 088 708 70 70.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum op telefoonnummer 088 708 70 70.