

Het verloop van de Irinotecan kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit 1 medicijn.

1. Irinotecan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I																					

Wijze van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. U krijgt voor de chemokuur medicatie in de vorm van een onderhuidse injectie toegediend om bijwerkingen tegen te gaan.

De toediening duurt ongeveer anderhalf uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 ° C moet u contact met ons opnemen.
- Als meest voorkomende bijwerking kan diarree optreden. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier keer daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingpatroon. Een bijwerking van de behandeling van diarree is namelijk obstipatie (verstopping).
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint vaak met een pijnlijke hoofdhuid. In enkele gevallen kan de haaruitval acuut optreden. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt