

## Myocardperfusiescan

Bij een myocardperfusiescan worden foto's van het hart gemaakt. Hierop kan de doorbloeding van de hartspier bekeken worden. Er worden foto's gemaakt direct nadat u zich hebt ingespannen (inspanningsonderzoek) en er worden foto's gemaakt zonder inspanning (rustonderzoek). Zo kan de doorbloeding tijdens inspanning worden vergeleken met die in rust. De onderzoeken worden uitgevoerd op twee verschillende dagen, de ene dag het inspanningsonderzoek en op de andere dag het rustonderzoek.

### Vorbereidingen

*Belangrijk: onderstaande voorbereidingen moeten zowel voor het inspanningsonderzoek als het rustonderzoek getroffen worden.*

- Het kan zijn dat u medicijnen voor het hart tijdelijk niet mag innemen of de dosering moet verlagen. Dit hoort u van uw cardioloog.
- Medicatie met maagzuurremmende werking (omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol en rabeprazol) moeten een dag vóór en op de dag van het onderzoek worden gestaakt.
- *De gehele dag vóór het onderzoek (24 uur van tevoren) zijn koffie (óók cafeïnevrije koffie), thee, cola en chocolade verboden!* Wanneer u één van deze voedingsmiddelen toch ingenomen hebt, is de uitslag van uw myocardperfusiescan onbetrouwbaar. Het onderzoek kan dan niet doorgaan!
- Voor het onderzoek mag u slechts een licht ontbijt (beschuit of boterham met jam, water of vruchtensap (maar géén koffie of thee!) gebruiken.
- Wanneer het onderzoek 's middags plaats vindt, dient u de laatste maaltijd minimaal 3 uur voor aanvang van het onderzoek te nuttigen.
- U wordt verzocht zelf een boterham met vetrijk broodbeleg (bijvoorbeeld kaas of vleeswaren) van huis mee te brengen. Voor het onderzoek is het belangrijk dat u in de tijd tussen de injectie van de onderzoeksvloeistof en het maken van de foto's een vette maaltijd nuttigt.

- Voor het inspanningsonderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen.
- Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Daarom kan u gevraagd worden sieraden, sleutels en andere metalen voorwerpen te verwijderen of bepaalde kledingstukken uit te trekken.
- Begeleiding is toegestaan, maar in verband met de beperkte wachtruimte vragen wij u niet meer dan één persoon mee te nemen. Tijdens het onderzoek zelf kan er in principe geen begeleider bij u zijn.
- Bent u zwanger, denkt u dit te zijn, of geeft u op dit moment borstvoeding, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

### Hoe gaat het onderzoek in zijn werk

Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee dagen: op de ene dag zal het *inspanningsonderzoek* plaatsvinden terwijl op de andere dag het *rustonderzoek* verricht wordt. [De volgorde van deze onderzoeken kan verschillen.](#)

### Inspanningsonderzoek

Bij aankomst op de afdeling nucleaire geneeskunde meldt u zich aan de balie bij de secretaresse. Vervolgens wordt u meegenomen naar een kamer waar het onderzoek wordt uitgevoerd. U moet zich van boven uitkleden en krijgt een infuus in uw arm. Op de borstwand worden plakkers

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

aangebracht voor het maken van een ECG (hartfilmpje).

Vervolgens moet u lichamelijke inspanning leveren op een soort fiets waarbij de belasting telkens wordt opgevoerd totdat uw maximum bereikt is. Via het infuus wordt dan de licht radioactieve onderzoeksvloeistof toegediend waarna u nog ruim een minuut moet doorfietsen.

Soms kan de inspanning van het hart beter worden nagebootst met behulp van een vloeistof die via het infuus wordt toegediend (bijvoorbeeld als fietsen niet of onvoldoende lukt).

Wanneer u vervolgens weer tot rust bent gekomen worden het infuus en de ECG-plakkers verwijderd. Daarna mag u zich weer aankleden en plaatsnemen in de wachtkamer. Dit alles duurt een half uur.

Direct na de lichamelijke inspanning moet u uw meegebrachte eten nuttigen. U hebt hier ongeveer een kwartier de tijd voor.

Na dit kwartier worden de foto's gemaakt. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

### **Rustonderzoek**

Bij aankomst op de afdeling nucleaire geneeskunde meldt u zich aan de balie bij de secretaresse. Vervolgens krijgt u via een injectie in uw arm de onderzoeksvloeistof toegediend. De foto's worden circa 60 minuten later gemaakt op dezelfde manier als bij het inspanningsonderzoek. Ook hier geldt dat u direct na de injectie uw meegebrachte eten moet nuttigen. Het maken van de foto's duurt ongeveer 30 minuten.

### **De uitslag**

Om te horen wat het onderzoek heeft uitgewezen wordt er een afspraak ingepland met uw behandelend cardioloog. U krijgt hierover telefonisch of schriftelijk bericht.

### **Bijwerkingen**

De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt zijn niet nadelig voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel weer uit uw lichaam

verdwenen en u hoeft thuis geen bijzondere maatregelen te nemen. Door dit onderzoek krijgt u geen overgevoelighedsreacties, ook niet als u overgevoelig bent voor jodium of contrastmiddelen. De rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.

Tijdens het inspanningsonderzoek kunt u klachten ervaren die u normaal ook bij inspanning hebt. Als de inspanning nagebootst wordt door een vloeistof toe te dienen, kunt u hiervan kortdurend klachten van hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid hebben. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

### **Opmerkingen**

Als u binnen vier weken na uw onderzoek of behandeling een vliegreis gaat maken, meld dit dan een paar dagen voor de afspraak bij de secretaresse van de afdeling nucleaire geneeskunde.

Dan wordt bekeken of het noodzakelijk is om een vliegbrief mee te geven. Hiermee kunt u aantonen dat u een onderzoek of behandeling met radioactieve stoffen heeft gehad.

### **Vragen**

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust. U kunt daarvoor bellen met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 708 56 70. U vindt ons op routenummer 1.15, ziekenhuislocatie Hengelo.

Ruimte voor informatie