

Cardioversie

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis voor een cardioversie. Door middel van een stroomstootje wordt uw onregelmatige hartritme, ook wel boezemfibrilleren of boezemflutter genoemd, regelmatig gemaakt. In deze folder geven wij u informatie over de behandeling.

Nuchter

De cardioversie vindt 's ochtends plaats, tenzij dit anders met u is afgesproken. U moet nuchter zijn; die dag mag u vanaf 00.00 uur niets meer eten. Tot twee uur voor de opname kunt u heldere vloeistoffen drinken: water, thee (zonder melk), koffie (zonder melk), limonade (zonder prik), vruchtensap en bouillon. Drink geen melk of sinaasappelsap. Als u na 12.00 uur aan de beurt bent, mag u een licht ontbijt gebruiken: een kopje thee zonder melk en een beschuit of boterham. Dit ontbijt mag u niet later nemen dan 08.00 uur. Ook in dit geval geldt dat u tot twee uur voor de opname heldere vloeistoffen mag drinken.

Medicijnen

U kunt uw medicijnen gewoon innemen met een slokje water, tenzij de arts iets anders met u heeft afgesproken. Als u plastabletten gebruikt en de behandeling vindt in de ochtend plaats, dan raden wij u aan om deze na de behandeling in te nemen.

Bent u diabeet en gebruikt u tabletten hiervoor, dan kunt u deze medicatie meenemen en na de behandeling innemen. U krijgt dan ook direct na de ingreep iets te eten aangeboden. Als u insuline spuit en de behandeling vindt in de ochtend plaats, spuit dan de halve hoeveelheid van wat u gewend bent en de andere helft na de behandeling. Vindt de behandeling in de middag plaats en spuit u 's middags insuline, spuit dan de halve hoeveelheid van wat u gewend bent en de andere helft na de behandeling. Gebruikt u 's middags tabletten voor uw diabetes, neem deze dan na de behandeling in.

Vergeet niet uw medicijnkaart en/of medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis?

Gebruikt u Sintrom®/Acenocoumarol of Marcoumar®/Fenprocoumon? Dan stellen wij de trombosedienst op de hoogte van de datum van de voorgenomen behandeling. Bent u voor de behandeling nog bij de trombosedienst? Vertelt u hen dan over de datum van de voorgenomen behandeling. Als u een NOAC (Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban of Edoxaban) gebruikt, dan kunt u deze blijven nemen.

Kleding

Een pyjama heeft u niet nodig. U krijgt een speciaal jasje aan.

Opname in het ziekenhuis

U meldt zich nuchter om 8.30 uur op de afdeling 3 west (route 3.4) Almelo. Loopt u gerust de afdeling op en daar helpt de verpleegkundige u naar de juiste kamer.

De cardioversie vindt 's ochtends plaats, tenzij dit anders met u afgesproken is.

CCU

Op de CCU (hartbewaking) brengt de verpleegkundige u naar uw kamer en voert met u een opnamegesprek. De verpleegkundige meet vervolgens uw bloeddruk en pols. Ook wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Als het hartfilmpje een regelmatig hartritme (sinusritme) toont, hoeft de behandeling niet plaats te vinden. U mag aansluitend weer naar huis. Als het hartritme onregelmatig is, gaat de behandeling door. U krijgt een infuusnaald in uw arm, tevens wordt er bloedafname verricht. De verpleegkundige

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

vertelt u hoe de behandeling in zijn werk gaat en beantwoordt eventuele vragen.

Nadat u bent opgenomen kan het zijn dat u een tijd moet wachten tot de behandeling wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met onze voorbereidingen en uitslagen van standaard bloedonderzoek of onvoorziene (spoed) omstandigheden.

De behandeling

De verpleegkundige plaatst enkele elektroden op uw borst om tijdens en na de behandeling uw hartslag te controleren. De arts spuit door de infuusnaald het slaapmiddel in. Dit kan een beetje pijnlijk/branderig aanvoelen. Ook krijgt u zuurstof toegediend.

Tijdens de behandeling ligt u plat op uw rug. Als u (bijna) slaapt, worden er twee koude geleiplakken op uw borst gelegd. Deze zorgen ervoor dat de stroom beter geleidt en de huid beschermd blijft. Pas als u helemaal in slaap bent, krijgt u de elektrische schok toegediend.

Duur van de behandeling

U mag meestal binnen twee uur na de behandeling weer naar huis. De behandeling zelf duurt ongeveer vijftien minuten.

Na de behandeling

Als u na de behandeling weer wakker wordt, kunt een slangetje met zuurstof in uw neus hebben. U hebt de elektroden nog op de borst om uw hartslag te controleren en een zuurstofmeter op de vinger.

Uit bed

Als u uit bed wilt, belt u eerst een verpleegkundige. U kunt duizelig worden bij het opstaan. Dit komt door het slaapmiddel. Soms hebt u een schrijnend/branderig gevoel op uw borst. De verpleegkundige kan u hier zelf tegen geven. Thuis mag u bodylotion gebruiken.

Naar huis

Als de verpleegkundige vindt dat u goed wakker bent, kunt u zich weer aankleden en mag u naar huis.

In verband met eventuele nawerking van het slaapmiddel mag u niet zelf autorijden of gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Alcohol op de dag van behandeling raden wij af.

Van de arts of verpleegkundige krijgt u instructies mee over het medicijngebruik. Als u nog geen controleafspraak bij de cardioloog heeft, wordt deze in overleg met u alsnog gemaakt.

Nazorg

Als de behandeling tot het gewenste resultaat heeft geleid, mag u de volgende dag uw normale activiteiten hervatten. De kans van slagen is groot, maar het kan zijn dat uw hartritme onregelmatig blijft. In dat geval krijgt u van de arts of verpleegkundige de verdere noodzakelijke informatie.

Veel voorkomende vragen

Veel voorkomende vragen van cardioversie zijn:

1. Hoelang duurt de opname? Gemiddeld twee uur.
2. Is er een risico aan verbonden?
 - Als uw bloed niet dun genoeg is (niet goed ontstold), loopt u een risico op het wegschieten van een stolsel vanuit het hart. Het is heel belangrijk dat u uw bloedverdunners volgens voorschrift inneemt, vooral in de laatste vier weken.
 - U kunt lichte brandwonden op de borst krijgen.
 - U kunt als gevolg van het slaapmiddel kortdurend licht misselijk worden.

- Het hartritme kan na de cardioversie wat traag op gang komen waardoor u soms wat langer ter observatie moet blijven.
3. Brengt het schade aan het hart toe?
Nee.
 4. Hoe vaak kan cardioversie worden uitgevoerd? In principe onbeperkt. Na meerdere cardioversies raden wij u aan om, in overleg met uw cardioloog, een andere aanpak te overwegen.

Andere vragen kunt u stellen aan de verpleegkundige of cardioloog.

Hebt u vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de polikliniek cardiologie

- Telefoonnummer 088 708 52 88.
Op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. Of mail naar cardiologie@zgt.nl

Heeft u binnen 24 uur na de cardioversie lichamelijke klachten?

Neem dan contact op met de afdeling CCU via telefoonnummer 088 708 34 30.