

CT lumbale wervelkolom na caudografie

Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van afbeeldingen van het wervelkanaal (caudografie) verwezen naar de afdeling radiologie.

Het is over het algemeen genomen een weinig pijnlijk onderzoek.

De caudografie wordt verricht door een radioloog geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant.

Bij dit onderzoek worden het ruggenmerg en de zenuwen die zich daar bevinden afgebeeld. Meestal wordt er aansluitend aan de caudografie een CT-scan van de rug gemaakt.

Melden (opname)

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De afdeling opnameplanning neemt telefonisch contact met u op, om de datum en het tijdstip van de opname aan u door te geven.

Op het met u afgesproken tijdstip kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis in de centrale hal.

Verhindering

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op: Telefoonnummer 088 708 37 00.

Belangrijk om te weten

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit **vóór** het onderzoek melden.

Allergieën

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden **vóór** het onderzoek.

Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Als u rookt, raden wij u aan om in ieder geval de uren voor de operatie niet te roken.

Luchtwegen van rokers zijn gevoeliger voor ontstekingen.

Vorbereiding

2 uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Onderstaand medicijn gebruik moet u opvolgen!

(tenzij uw behandelend specialist anders voorgeschreven heeft)

- Diuretica (plastabletten) niet innemen op de dag van het onderzoek.
- Apixaban(Eliquis), abigatran(Pradaxa),Edoxaban(Lixiana), Rivaroxaban(Xarelto): 2 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.
- Sintrom of Acenocoumarol: 3 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.
- Marcoumar, Fenprocoumon, Ascal, Persantin, Plavix, Clopidogrel : 7 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant vraagt u op uw linkerzij op de onderzoekstafel te gaan liggen. De huid op uw rug wordt ontsmet met chloorhexidine. Daarna brengt de radioloog een dunne naald in, in het wervelkanaal. Als de naald op de goede plaats zit, wordt een

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

kleine hoeveelheid ruggenmergvocht (liquor) afgenomen. De onderzoekstafel wordt met het hoofdeinde iets hoger gezet; de radioloog spuit contrastvloeistof in, wat een koud gevoel kan geven in de rug.

De contrastvloeistof zorgt ervoor dat het wervelkanaal zichtbaar wordt op een röntgenfoto. Na het inspuiten van de contrastvloeistof verwijderd de radioloog de naald. Hierna worden er röntgenfoto's gemaakt.

Aansluitend wordt u met een bed naar de CT-scanner gebracht en wordt de CT-scan van uw rug en wervelkanaal gemaakt.

Het CT-apparaat ziet eruit als een grote ring, de onderzoekstafel schuift door deze ring. U komt op deze verschuifbare onderzoekstafel te liggen. De laborant vertelt u hoe u moet gaan liggen. De tafel schuift meermaals heen en weer in de open ring. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt. De scan duurt ongeveer 5 minuten.

Naar de verpleegafdeling

Na het onderzoek (De caudografie en de CT-scan) wordt u in bed teruggebracht naar de afdeling.

U heeft 2 uur bedrust. Het hoofdeinde van het bed staat omhoog, zodat de contrastvloeistof niet naar het hoofd kan lopen.

Als u zich goed voelt mag u na 2 uur het bed uit en kunt u naar huis gaan.

Een klein aantal patiënten krijgt na het onderzoek last van hoofdpijn en misselijkheid. Mocht dit bij u het geval zijn, dan raden wij u aan op bed te gaan liggen met een verhoging onder het hoofdeinde van uw bed. U moet veel drinken. Tegen hoofdpijn mag u paracetamol innemen.

Vervoer

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. U kunt na het onderzoek niet fietsen of autorijden.

Nazorg thuis

Wilt u bij een van onderstaande klachten direct contact opnemen?

- Koorts (38,5 °C en hoger)
- Nabloeding
- Zwelling
- Aanhoudende pijn

Dit kan maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur met de afdeling radiologie, telefoonnummer 088 708 37 00.

Heeft u een van bovenstaande klachten of andere klachten en/of vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, dan belt u buiten kantooruren met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist.

Medische apparatuur (zoals een insulinepomp)

Gebruikt u een medisch apparaat zoals een insulinepomp of (externe) neurostimulator? Er bestaat een kleine kans dat de werking van het apparaat verstoord raakt door blootstelling aan röntgenstraling. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien hoe u hiermee om moet gaan.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.