

Scleroseren cyste

Uw behandelend specialist heeft u voor het scleroseren van een cyste in uw lever of in uw nier verwezen naar de afdeling radiologie. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is afhankelijk van de behandeling en is vooraf met u besproken. De behandeling vindt plaats op het OK. Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo. Datum en tijdstip wordt u per post toegestuurd.

Belangrijk om te weten

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor de behandeling melden.

Overgevoeligheden

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor de behandeling. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Dieet

- Tot een ½ uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt gebruiken: 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft uw specialist u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u **Plavix (clopidogrel)** gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique (ticagrelor)** gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)** gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix (clopidogrel)** in combinatie met Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met **Plavix**.
- Als u **Brilique (ticagrelor)** in combinatie met **Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)** gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met **Brilique (ticagrelor)**.
- Als u **Sintrom (acenocoumarol)** gebruikt, dient u hier 3 dagen voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Marcoumar (fenprocoumon)** gebruikt, dient u hier 7 dagen voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Pradaxa (dabigatran)** gebruikt, dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Xarelto (rivaroxaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Eliquis (apixaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Lixiana (Edoxaban)** gebruikt dient u hier 48 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen, tenzij anders is voorgeschreven.

Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend specialist.

Kleding

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de OK is het niet toegestaan om tijdens de behandeling een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan.

Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen.

Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de behandeling wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen.

Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten.

Het streven is u anderhalf uur na opname te behandelen, echter kan het tijdstip uitlopen in verband met spoed patiënten.

U wordt in een bed naar de OK gebracht.

Gedurende het verblijf op de OK wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure).

In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht. Daarna neemt een interventielaborant u mee naar de interventiekamer. Tijdens de behandeling bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Afhankelijk van de plaats van de cyste vragen wij u in rugligging, zijligging of buikligging op de behandeltafel te gaan liggen. Met behulp van echografie zal de interventieradioloog de

juiste aanprikplaats bepalen. Om infecties te voorkomen is steriel werken erg belangrijk, tijdens de behandeling wordt uw huid ontsmet en krijgt u een steriel laken over borst, buik en benen.

De aanprikplaats en het diepere gelegen weefsel wordt plaatselijk verdoofd. Als de cyste is aangeprikt wordt in de cyste een drain (dun slangetje) ingebracht.

Via deze drain wordt de cyste leeg gezogen en een vloeistof ingebracht.

Deze vloeistof schakelt de cellen in de cyste uit, die het vocht produceren. Afhankelijk van de grootte van de cyste, moet de behandeling soms worden herhaald.

Afhankelijk van de grootte van de cyste gaat de drain er gelijk uit, of de drain blijft een aantal uren zitten en wordt vastgeplakt met pleisters. U komt dan later terug om de drain te laten verwijderen.

Duur

De duur van de behandeling is moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het 60 minuten.

Na afloop van de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de verpleegafdeling.

Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en pols, evenals de prikplaats.

De zaalarts zal beslissen wanneer u kunt (her)starten met uw (eventuele) medicatie.

Complicaties

Geen enkele invasieve behandeling (behandeling waarbij de huid of slijmvliezen worden gepasseerd) is zonder risico's. Zo kan ook tijdens of na het scleroseren van een cyste complicaties optreden.

Ter plaatse van de aanprikplaats kan een blauwe plek ontstaan. Dit is vervelend, maar het trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Vervoer

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen.
U mag de dag van ontslag niet fietsen of autorijden.

Instructies voor thuis

De volgende regels worden aanbevolen na uw ontslag

- U kunt zich thuis douchen.
- De wond mag echter niet verweken. Daarom mag u de eerste vier dagen na de behandeling geen bad nemen en niet zwemmen.
- Verwijder de pleister de volgende dag. Maak de huid schoon met milde zeep en water. Tevens de wond voorzichtig afdrogen.
- Aangepaste activiteiten gedurende 3-4 dagen: niet persen, niet bukken, zo min mogelijk de trap op- en afdgaan. Niet zwaarder tillen dan 5 kilo.

Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- De aanprikplaats erg gevoelig/pijnlijk is.
- Een zwelling ter plaatse van de aanprikplaats optreedt.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw behandelend specialist.

Buiten kantoor tijden kunt u bellen met de spoedeisende hulp post van ZGT,
088 - 708 7878

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via het secretariaat van uw behandelend specialist.

Bent u verhinderd?

Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.