


Paracetamol doseringsadvies voor kinderen

Dit formulier graag meenemen op de operatiedag

Voor-en achternaam:.....Gewicht:.....kg

De doseringen die in ZGT aan uw kind gegeven zijn, kruisen wij af in dit schema. De doseringen zijn hoger dan u normaal zou geven. Dit is in deze situatie de bedoeling. Dit doseringsadvies uitsluitend gebruiken op de operatiedag en de dag erna. Heeft uw kind na dit schema nog paracetamol nodig?

Verlaag dan de dosering volgens de normale bijsluiter.

Vóór de operatie geeft u thuis de eerste paracetamol zetpil(len). Alleen na overleg een smelttablet. Echter nooit paracetamolstroop. 

| Gewicht | Operatiedag | | | Dag na de operatie | | |
|-----------|-------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
| | 1e dosis | 2e dosis | 3e dosis | 1e dosis | 2e dosis | 3e dosis |
| | Thuis 7 uur | 13 uur | 19 uur | 7 uur | 13 uur | 19 uur |
| 4 t/m 5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 7 | 120+60 | 120+60 | 120+60 | 120+60 | 120+60 | 120+60 |
| 8 t/m 10 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 13 t/m 15 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 |
| 17 t/m 21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 t/m 32 | 500+250 | 500+250 | 500+250 | 500+250 | 500+250 | 500+250 |
| 33 t/m 43 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| Gewicht | Operatiedag | | | | Dag na de operatie | | | |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| | 1e dosis | 2e dosis | 3e dosis | 4e dosis | 1e dosis | 2e dosis | 3e dosis | 4e dosis |
| | Thuis 7 uur | 11 uur | 15 uur | 19 uur | 7 uur | 11 uur | 15 uur | 19 uur |
| 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 11 t/m 12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 16 kg | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 | 240+120 |
| 22 t/m 27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| > 44 kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Let op! Vanaf 11 kg mag u 125 mg paracetamol geven waar 120 staat en 250 mg paracetamol waar 240 staat. Paracetamol stroop (24 mg/ml) mag alleen na de operatie. Er dient **minimaal 4 uur tussen twee giften paracetamol te zitten.**

Heeft uw kind naast de paracetamol een extra pijnstiller (diclofenac) voor geschreven gekregen? Gebruik deze volgens voorschrift zoals op het doosje staat vermeld. U mag de diclofenac zetpillen eventueel tegelijk toedienen met de paracetamol zetpillen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt



De naam van de
organisatie-eenheid

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.