

Het verloop van de Eribulin kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1. Eribulin

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
E							E													

Wijze van toediening:

Dit medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm, op dag één en acht. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer drie kwartier.

De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee à drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Klachten van spier- en/of gewrichtspijn kunnen voorkomen. U mag hiervoor zo nodig tot maximaal vier keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten cytostatica kunnen tot dag zestien in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om moet gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo