

## Inbrengen JJ-katheter via nierdrain

Uw behandelend specialist heeft u verwezen voor het inbrengen van een katheter van uw nier naar uw blaas. In deze folder leest u over de voorbereiding op deze behandeling, de behandeling zelf, de nazorg en het ontslag.

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is vooraf met uw specialist besproken. De behandeling vindt plaats op de OK.

Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo. Datum en tijdstip wordt u per post toegestuurd.

### Blokkade urineleider

Wanneer urine vanuit de nier niet via de urineleider naar de blaas kan aflopen, kan een JJ-katheter worden ingebracht om te zorgen dat de urine alsnog vanuit de nier naar de blaas kan aflopen.

Via de nierdrain, die inmiddels bij u is ingebracht, kan de interventieradioloog onder doorlichting een JJ-katheter inbrengen. Een JJ-katheter is een dun, flexibel buisje met aan de uiteinden een krul. Vandaar de naam JJ-katheter.

### Belangrijk om te weten

#### Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.

#### Overgevoeligheden

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor het onderzoek.

### Dieet

Tot een ½ uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt/ lunch gebruiken:

- 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

### Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft uw behandelend specialist u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u **Plavix** of **Grepid** (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix** of **Grepid** (clopidogrel) in combinatie met **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/ carbasalaatcalcium) gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met **Plavix/ Grepid**.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) in combinatie met **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/ carbasalaatcalcium) gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met **Brilique** (ticagrelor)
- Als u **Sintrom** (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier 3 dagen voor de behandeling mee te stoppen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Als u **Marcoumar** (fenprocoumon) gebruikt, moet u hier 7 dagen voor de behandeling mee stoppen.
- Als u **Pradaxa** (dabigatran) gebruikt, moet u hier 48 uur voor de behandeling mee stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Xarelto** (rivaroxaban) gebruikt moet u hier 48 uur voor de behandeling mee stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Eliquis** (apixaban) gebruikt moet u hier 48 uur voor de behandeling mee stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.
- Als u **Lixiana** (edoxaban) gebruikt moet u hier 48 uur voor de behandeling mee stoppen. Dit in overleg met uw behandelend specialist.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen, tenzij anders is voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom, Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

**Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend specialist.**

### Kleding

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de OK, is het niet toegestaan om tijdens de behandeling een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejas. Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen. Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de behandeling wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen.

Sieraden kunt u het beste thuis laten.

### Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten. Het streven is u anderhalf uur na opname te behandelen, echter kan het tijdstip uitlopen in verband met spoed patiënten. U wordt in een bed naar de OK gebracht. Gedurende het verblijf op de OK wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole. U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure). In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht. Daarna neemt een interventielaborant u mee naar de interventiekamer. Tijdens de behandeling bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Afhankelijk van de entreeplaats van uw nierdrain wordt u in buik- of zijligging gelegd. De huid en de nierdrain wordt vervolgens ontsmet. Tijdens de behandeling wordt u toegedekt met steriele lakens.

Onder rontgendoorlichting zal de interventieradioloog door de nierdrain een flexibele metalen draad (voerdraad) naar de blaas (of urinestoma) inbrengen. De nierdrain wordt vervolgens vervangen door een toegangsbuisje waardoor de benodigde materialen kunnen worden gebruikt. Indien nodig wordt voor het inbrengen van de JJ-katheter gedotterd. Dit kan gevoelig zijn.

Afhankelijk van hetgeen met uw behandelend specialist is afgesproken zal na plaatsing van de JJ-katheter de nierdrain wel of niet worden verwijderd. Indien de nierdrain blijft zitten zal de interventielaborant de drain op de huid bevestigen en aansluiten op de urineopvangzak.

Indien de drain verwijderd kan worden wordt de nierdrain afgedopt en doorgaans de volgende dag onder rontgendoorlichting

verwijderd. Indien u hiervoor nog geen afspraak heeft krijgt u deze mee.

### **Duur**

De duur van de behandeling is moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het 60 minuten.

### **Na afloop van de behandeling**

Na de behandeling wordt u door de interventielaborant overgedragen aan een verpleegkundige van de recovery. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling. Als u weer op de verpleegafdeling bent kunt u, in overleg met de zaalarts, weer eten en drinken. Meestal wordt 2 uur bedrust geadviseerd, daarna kunt u weer mobiliseren. De zaalarts zal de uitslag van het onderzoek met u bespreken. Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u kunt herstarten met uw antistollingsmedicatie.

### **Complicaties**

Geen enkele behandeling is zonder risico's.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium.
- Alle ingrepen aan de nier, urineleider of blaas kunnen leiden tot een bloeding. Over het algemeen stopt deze vanzelf; zeer zelden moet een operatie volgen.
- Indien de urineleider moet worden gedotterd kan deze inscheuren. Deze complicatie komt zeer zelden voor. Bij deze complicatie moet een operatie volgen.

### **Controleafspraak**

U krijgt op de verpleegafdeling of van de behandelend specialist een vervolgaafspraak voor een polibezoek.

### **Instructies voor thuis**

Als u naar huis mag geeft een verpleegkundige van de verpleegafdeling u instructies mee voor thuis.

### **Neem contact op indien**

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- Toename van pijn.
- Urine verandert van kleur (roder wordt)

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat urologie:

- Ziekenhuislocatie Almelo, telefoonnummer 088 708 33 60.
- Ziekenhuislocatie Hengelo, telefoonnummer 088 708 52 60.

Buiten kantooruren kunt u (bij deze klachten of andere klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag) contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp van ZGT: telefoonnummer 088 708 78 78.

### **Vragen**

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via secretariaat urologie, telefoonnummer 088 708 33 60 of 088 708 52 60.

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: [www.zgt.nl/mijnzgt](http://www.zgt.nl/mijnzgt).