

Sluiting van het harde gehemelte bij schisis (18-24 maanden)

Uw kindje is geboren met een lip- en/of gehemeltespleet. Om deze te sluiten moet het verschillende operaties ondergaan. Dit is de derde operatie. Hierbij wordt het harde gehemelte dicht gemaakt. De operatie wordt gedaan door de plastisch chirurg samen met de mond-, kaak- en aangezichts chirurg.

Preoperatieve polikliniek

Als voorbereiding op de operatie wordt uw kind op de polikliniek preoperatieve screening onderzocht. Tijdens dit preoperatieve onderzoek wordt de pijnmedicatie afgesproken en wanneer uw kind de laatste voeding mag hebben. Ook krijgt u een recept en een folder 'Paracetamol kinderen' en 'Anesthesie kinderen' mee.

Vorbereidingen thuis

- Geef volgens afspraak de laatste voeding;
- Geef uw kind volgens afspraak de eerste paracetamol zetpil;
- Doe uw kind in bad of onder de douche;
- Trek uw kind schone, gemakkelijk zittende kleding aan;

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, dient u deze toe zoals met u is afgesproken bij uw bezoek aan de preoperatieve screening.

Wilt u het volgende meenemen?

- Eigen beker of drinkfles;
- Schoon T-shirt;
- Extra luier;
- Eventueel eigen (dieet)voeding;
- Knuffel of speelgoed;
- Eventuele eigen medicijnen.

Wilt u alstublieft geen broertjes of zusjes mee te nemen op de dag van de operatie.

Wij vragen u dringend contact op te nemen met de polikliniek plastische chirurgie als uw kind:

- Koorts heeft of ziek is;
- In contact is geweest met iemand met een besmettelijke kinderziekte;
- Gevaccineerd is korter dan drie weken voor de operatie.

De operatie

Wanneer uw kind aan de beurt is voor de operatie wordt u begeleid naar de operatiekamer. Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer tot uw kind onder narcose is gebracht.

De operatie duurt ongeveer negentig minuten en wordt uitgevoerd de plastisch chirurg in samenwerking met de mond-, kaak en aangezichts chirurg. Na de operatie mag één van de ouders naar de uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, gaat u samen met uw kind en een verpleegkundige terug naar de kinderafdeling.

Na de operatie heeft uw kind een infuus, soms een neus-maagsonde en soms spalkjes om de armen. Deze spalkjes voorkomen dat uw kind aan de wond zit of de sonde of het infuus er uit trekt.

Terug op de kinderafdeling

Op de kinderafdeling wordt uw kind bewaakt met een monitor. Uw kind kan onopgemerkt nabloeden. Dit komt omdat kinderen de neiging hebben alles door te slikken wat in de mond komt. Daarom wordt de bloeddruk om die reden regelmatig gemeten.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Pijnbestrijding

Voor goed herstel is het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft.

Pijnbestrijding wordt gegeven via een infuus en met zetpillen. Tijdens het opnamegesprek wordt u uitgelegd dat verpleegkundigen met behulp van meetinstrumenten goed bijhouden of en hoeveel pijn uw kind heeft na de operatie. Als u denkt dat uw kind pijn heeft, is het belangrijk dit aan de verpleegkundige te melden, zodat deze de benodigde pijnstillers kan geven.

Eten en drinken

Meestal mag uw kind enkele uren na de operatie weer beginnen met drinken:

- De eerste dag na de operatie mag uw kind heldere, vloeibare en koude dranken uit een beker of tuitbeker drinken. Niet met een rietje of speen.
- De tweede dag mag uw kind glad gebonden vloeibaar voedsel proberen te drinken.
- Bij ontslag uit het ziekenhuis, na ongeveer drie tot vier dagen, mag uw kind gedurende drie weken gemalen voeding, wit brood zonder korst en gemalen fruit eten.
- Daarna mag uw kind weer normaal eten.

Tijdens de opname in het ziekenhuis komt de mondhygiëniste regelmatig langs om de mond uw kind te controleren, of u gaat met uw kind naar de polikliniek.

Wanneer naar huis?

De chirurgen en de kinderarts bepalen wanneer uw kind naar huis mag. Meestal is dat de derde of vierde dag na de operatie.

Controleafspraak

U krijgt voor uw kind een controleafspraak bij de chirurgen en de mondhygiëniste voor ongeveer een week na de operatie.

Richtlijnen voor thuis

Eten en drinken

- In de eerste drie weken na de operatie mag uw kind geen scherpe voorwerpen in de mond stoppen, niet met een rietje drinken en liever niet zuigen op een speen of duim.
- Spoel de eerste drie weken na de operatie de mond na het eten wat na met water om te voorkomen dat er voedselresten in de wond blijven plakken. Geef het water met behulp van beker of tuitbeker. Na deze drie weken mag uw kind weer normaal eten, zonder te spoelen.
- Geen neus snuiten, maar veeg de neus alleen af als dat nodig is.

Pijn

Geef uw kind de pijnstillers die zijn voorgeschreven als u denkt dat uw kind pijn heeft.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook bij deze operatie is er kans op complicaties. Deze zijn niet groter dan bij andere operaties. Soms ontstaat er een nabloeding of een wondinfectie.

Wanneer neemt u contact op

- Als het wondje weer begint te bloeden.
- Als uw kind meer dan 39°C koorts heeft.
- Als uw kind ondanks de pijnstillers pijn lijkt te hebben.

Contact

Op werkdagen kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met:

Ziekenhuislocatie Almelo

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 088 708 52 45.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 088 708 33 80.

Spoedeisende hulp

Neem buiten kantoortijden contact op met de spoedeisende hulp.

Telefoonnummer 088 708 78 78.

Medisch Spectrum Twente Enschede

Plastische chirurgie

Telefoonnummer 0541 57 43 80.

Mond-, kaak en aangezichtschirurgie

Telefoonnummer 053 487 27 20.

Neem buiten kantoortijden contact op met:

Spoedeisende hulp

Telefoonnummer 053 487 20 00.

Victor Veau stichting

Telefoonnummer 06 30 37 73 65

E-mail: secretariaat@schisis-team.nl.

Kijk voor meer informatie ook op:

www.schisis-team.nl.

Tot slot

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw behandelend specialist aan u kenbaar gemaakt worden.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek mond-, kaak en aangezichtschirurgie.

Check het dossier van uw kind op MijnzGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij hebben klaargezet. Kijk voor meer info op:

<https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf>