

Het verloop van de Paclitaxel /Trastuzumab kuur (12 keer wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. **Paclitaxel** (= Taxol)
2. **Trastuzumab** (=Herceptin)

1	2	3	4	5	6	7
P						
T						

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

De eerste toediening duurt in totaal zes uur omdat u na toediening ter observatie moet blijven. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de eerste toediening duren de tweede en derde kuren ongeveer drie uur. De vervolgekuren duren ongeveer twee en een half uur.

Om een allergische reactie op de paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf aan iedere kuur via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen wekelijks gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5°C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal drie à zes weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag zondig maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag drie in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij trastuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.