

Azathioprine

Uw reumatoloog heeft azathioprine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Dit is een klassieke reumaremmers. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van azathioprine

Azathioprine wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, artritis psoriatica, systemische lupus erythematoses, vormen van vasculitis (bloedvatontsteking) en ontstekingsziekten van de darm. Azathioprine kan de oorzaak van reumatische aandoening niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. Hierdoor kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten na enige tijd afnemen. Ook heeft het een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat azathioprine begint te werken. Een nadeel is dat uw afweersysteem geremd wordt waardoor u vatbaarder bent voor infecties.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend

- Maag- en darmklachten zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijk en braken of diarree.
- Overgevoelighedsreacties zoals (jeukende) huiduitslag, koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- Erge keelpijn met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken (tekenen van stoornis in bloedaanmaak).

Soms/zelden voorkomend

- Stoornissen in de werking van de lever, hier merkt u meestal niets van. Dit kan wel aangetoond worden bij bloedonderzoek.

Wijze van innemen

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 en 50 milligram. De eerste week gebruikt men meestal een tablet azathioprine van 50 milligram per dag. Daarna worden meestal twee of drie tabletten van 50 milligram per dag voorgeschreven. U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd, dus met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u de tabletten vergeten hebt in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in.

Waarschuwingen

- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: koorts, koude rillingen, ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bijwerkingen (met name huiduitslag, erge keelpijn met koorts, bloedneuzen en snel blauwe plekken).
- Als u veel last hebt van misselijkheid en braken, neem de tabletten dan in vóór het slapen gaan. Meestal hebt u dan minder last hiervan. Als u desondanks nog steeds veel bijwerkingen heeft, dan kunt u stoppen met azathioprine. Noteer dan wel op welke dag u bent gestopt en waarom.
- Gebruik van allopurinol (voor jicht) kan de werking van azathioprine versterken waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Daarom zal uw reumatoloog de dosering van azathioprine meestal verlagen.
- Voorzichtig zijn met alcohol. De kans is groter dat u stoornissen krijgt in de werking van de lever. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed laten onderzoeken. In de beginperiode zal dit vaker dan in een later stadium zijn. De uitslag hiervan is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen hiervoor. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslagen afwijkend zijn.

Tandheelkundige ingrepen

Azathioprine mag u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven innemen. Informeer tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met azathioprine.

Geplande operaties

Azathioprine kunt u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven innemen. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene die de operatie uitvoert alsnog voor de zekerheid besluiten om azathioprine tijdelijk te staken. Het is verstandig om uw reumatoloog tijdig te informeren dat u een operatie moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met azathioprine.

Reizen en vaccinaties (inentingen)

Griepvaccinatie

kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met reumaremmers aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening hiervan wordt zelfs aanbevolen.

Reisvaccinaties

heeft u een reis naar een (tropisch) land in de planning waarvoor reisvaccinaties nodig zijn (denk aan gebieden als Afrika en Zuid-Amerika) of gaat u naar een land zonder goede medische en hygiënische

voorzieningen? In dat geval is het verstandig om uw reumatoloog of reumaverpleegkundige tijdig hiervan op de hoogte te stellen. Het reizen naar landen waarvoor toediening van een 'levend verzwakte vaccinatie' vereist is of waar bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC (tuberculose) en gele koorts voorkomen, wordt afgeraden. Tijdens het gebruik van azathioprine mag u geen 'levend verzwakte vaccinaties' toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door azathioprine kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog, reumaverpleegkundige en/of degene die de vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Neem tijdig contact op (minimaal drie maanden voordat u zwanger wilt worden) met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om te overleggen of azathioprine invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen), het ongeboren kind, de zwangerschap zelf en borstvoeding. Indien u zwanger geraakt bent onder het gebruik van azathioprine neem dan contact op met uw reumatoloog of huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.