

Het verloop van de Irinotecan kuur (wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit 1 medicijn.

1. Irinotecan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
I							I							I														

Wijze van toediening:

Het medicijn wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De toediening duurt ongeveer 1,5 uur. Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om bijwerkingen tegen te gaan.

De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen 3 keer wekelijks gegeven gevolgd door een week rust.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 ° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan 4x daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de medicijnen die u krijgt voorgeschreven kunnen obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt