

## Het verloop van de Cisplatin/Pemetrexed kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Cisplatin
2. Pemetrexed (=Alimta)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C P																				

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de verpleegafdeling oncologie van de ZGT. De Cisplatin en Pemetrexed worden u toegediend op dag 1. Hierna wordt u 1 nacht opgenomen voor het toedienen van extra vocht. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de 3 weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw arts.
- Om de schadelijke werking van cytostatica op uw nieren te verminderen krijgt u tijdens de behandeling extra vocht toegediend. Daarvoor dient u een nacht opgenomen te worden.
- U kunt vocht gaan vasthouden en daardoor in gewicht toenemen.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie krijgt u een vitamine B12 injectie, dit wordt om de 9 weken herhaald zolang u aan het kuren bent. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.
- Eén week voordat u start met de chemotherapie gaat u starten met foliumzuur, elke ochtend 1 tablet. Hier gaat u mee door tot en met 3 weken na de laatste chemokuur. Dit wordt gegeven om de werking en de verdraagzaamheid van Pemetrexed te verbeteren.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

- Resten cytostatica kunnen tot dag 8 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen