

## Schema bridging antistolling; Acenocoumarol

Uw behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat er een onderzoek wordt verricht. Om dit onderzoek zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat uw bloedverdunners worden gestopt en moet er een overbrugging plaatsvinden met Fragmin (injectie). In deze folder geven wij u hier meer informatie over.

### Voor het onderzoek

Voor de periode zonder Acenocoumarol krijgt u een recept voor een injectie Fragmin (dalteparine) mee. De Fragmin (dalteparine) neemt de werking van de acenocoumarol tijdelijk over. In het schema hieronder staat aangegeven wanneer u moet stoppen met de acenocoumarol en moet starten met de injecties.

**Naam:**

**Geboortedatum:**

**Datum onderzoek:**

### ACENOCOUMAROL

	3 dagen voor het onderzoek	2 dagen voor het onderzoek	1 dag voor het onderzoek	De ochtend van het onderzoek
<b>Datum</b>				
<b>Acenocoumarol</b>	Stop	Stop	Stop	Stop
<b>Fragmin ....IE; Ochtend</b>	X	1 injectie	1 injectie	X
<b>Fragmin ....IE; Avond</b>	X	1 injectie	X	

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

### Na de scopie

Uw behandelend specialist geeft na het onderzoek aan wanneer u de acenocoumarol weer kunt innemen.

Voordat u weer goed ingesteld bent op uw eigen bloedverdunner, kan het nodig zijn nog een aantal dagen Fragmin (dalteparine) injecties te gebruiken.

<b>Herstart Acenocoumarol is afhankelijk van de bevindingen bij het onderzoek en in overleg met trombosedienst en scopierend arts</b>			
	Herstart Fragmin ..... IE  (U moet hiermee doorgaan tot de trombosedienst aangeeft dat u mag stoppen)	08.00 uur  In opdracht van scopierend arts	20.00 uur  In opdracht van scopierend arts
	Herstart  <input type="checkbox"/> Acenocoumarol	In opdracht van scopierend arts	

### Contact met trombosedienst

Het is verstandig dat u de trombosedienst op de hoogte brengt van uw geplande onderzoek en het feit dat u dient te stoppen met uw bloedverdunner.

### Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder?

Neem dan contact op met de polikliniek interne geneeskunde. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer: 088 708 70 70

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt).