

Het verloop van de R-CVP/COP kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **R**ituximab
2. **C**yclofosfamide
3. **O**ncovin (=Vincristine)
4. **P**rednison

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
R																				
C																				
O																				
P	P	P	P	P																

Wijze van toediening:

Rituximab, oncovin en cyclofosfamide worden u toegediend via een infuus in een ader in uw arm of hand. Deze behandeling vindt plaats op de oncologiepoli van de ZGT. De toediening duurt ongeveer drie en een half uur. De eerste en de tweede kuur duren langer aangezien de rituximab dan langzamer inloopt. De prednison kunt u zelf innemen, want dit zijn tabletten. U begint hiermee op de ochtend van de chemokuur en slikt dit elke kuur vijf dagen achter elkaar. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de chemokuur veel drinkt (anderhalf tot twee liter).
- Door oncovin is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Door prednison kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag vier in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van de rituximab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.