

Cristabiopsie/beenmergpunctie

Binnenkort wordt u in ZGT verwacht voor een beenmergpunctie/beenmergbiopsie. Dit is een onderzoek waarbij beenmerg en eventueel een stukje botweefsel uit het heupbeen (crista) of borstbeen (sternum) voor onderzoek wordt afgenomen.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een cristabiopsie/beenmergpunctie.

De afspraak is gepland op:

Dag:.....

Datum:.....

Tijd:.....

Locatie:

- Hengelo; dagbehandeling oncologie, routenummer 0.17
- Almelo; Bij het behandelcentrum, routenummer 1.4

Vorbereiding

Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Vertel uw behandelend arts of u:

- Medicijnen gebruikt (onder andere bloedverdunnende medicijnen)
- Allergisch bent voor jodium of verdovingsmiddelen.

Het onderzoek

- Cristabiopsie

In de behandelkamer vragen wij u om uw heup te ontbloten en op uw linkerzij te gaan liggen. Vervolgens wordt de huid ter hoogte van uw rechterheup ontsmet en daarna plaatselijk verdoofd. Door middel van een botboring wordt wat beenmerg opgezogen uit het heupbeen. Dit opzuigen kan pijnlijk zijn. De pijn is echter kortdurend en na afloop van de behandeling snel verdwenen.

Eveneens kan er een stukje botweefsel via een naald afgenomen worden. Dit kan een trekkende pijn naar het been veroorzaken. Ook deze pijn verdwijnt zodra de naald uit het

bot is gehaald. Na afloop wordt het wondje afgeplakt. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis.

- Sternumpunctie

In de behandelkamer vragen wij u het borstbeen te ontbloten, daarna neemt u in rugligging plaats op de onderzoekstafel. Vervolgens wordt de huid ter hoogte van uw borstbeen ontsmet en daarna plaatselijk verdoofd. Door middel van een botboring wordt wat beenmerg opgezogen uit het borstbeen. Dit kan pijnlijk zijn. De pijn is echter kortdurend en na afloop van de behandeling snel verdwenen. Na afloop wordt het wondje afgeplakt. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is ongeveer vijftien minuten. Het kan zijn dat u na het onderzoek nog vijftien minuten ter observatie moet blijven.

Uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag na ongeveer zeven tot tien dagen. Tijdens het spreekuur op de polikliniek, of bij zijn ronde op de verpleegafdeling, zal de arts de uitslag van het onderzoek met u bespreken. Hierop zal een verdere behandeling worden gebaseerd. Het is mogelijk dat er nog andere onderzoeken nodig zijn.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Nazorg

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u gedurende enig tijd een beurs gevoel in de bil of op het borstbeen houden. U mag paracetamol innemen tegen de pijn. De pleister die op de wond is geplakt mag u na 24 uur verwijderen.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U kunt bellen met:
Secretariaat Internisten/Oncologie
telefoonnummer 088 708 7076

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.