

Het verloop van de Cisplatin/Gemcitabine kuur (wekelijks)

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Cisplatin
2. Gemcitabine

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
C G							C G														

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT.

De Cisplatin en Gemcitabine worden u toegediend op dag 1 en 8. De toediening duurt ongeveer 2,5 uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Het is mogelijk dat na enkele kuren uw gehoor (blijvend) wat afneemt. Geef dit door aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.
- Om de schadelijke werking van cytostatica op uw nieren te verminderen krijgt u tijdens de behandeling extra vocht toegediend.
- U kunt vocht gaan vasthouden en daardoor in gewicht toenemen.
- Deze kuur kan griepachtige verschijnselen veroorzaken, u kunt daardoor spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen. Zonodig kunt u maximaal 4 keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- Resten cytostatica kunnen tot dag 15 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Almelo

Zilvermew 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt