

Het verloop van de Melfalan/Prednison/Velcade (MPV) kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen:

1. **M**elfalan
2. **P**rednison
3. **V**elcade (=Bortezomib)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
M P V	M P	M P	M P V				V			V											
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
V			V				V			V											

Wijze van toediening:

De velcade is een onderhuidse injectie. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. De melfalan en prednison zijn in tabletvorm en neemt u van dag één t/m dag vier.

De totale toediening duurt ongeveer vijftien minuten. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de zes weken gegeven. Het kan zijn dat u tussendoor extra bloed moet laten prikken.

Overige medicatie:

U krijgt één keer per drie maanden zoledroninezuur via het infuus. Deze toediening duurt ongeveer een half uur. Indien dit kan worden gecombineerd met de kuur dan duurt de totale toediening ongeveer een half uur langer.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 moet u contact met ons opnemen.
- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door Prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Tevens kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of de oncologieverpleegkundige. In de bijgeleverde folder van de Velcade staat een 'vragenlijst voor perifere neuropathie' ter inventarisatie van deze klachten. Wij vragen u deze lijst te hanteren bij het inventariseren van uw klachten.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjBP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

- De injectie kan plaatselijk een rode verkleuring van de huid geven. Injectieplaatsen dienen geroteerd te worden. U krijgt een schema mee waarop de verpleegkundige iedere injectieplaats noteert.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor eventueel een pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Resten Velcade en Melfalan blijven 72 uur na elke gift in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

In de bijgeleverde folder van de Velcade leest u overige specifieke informatie betreffende de behandeling.

Indien u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.