Sulfasalazine (Salazopyrine®)

Uw reumatoloog heeft u sulfasalazine voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Dit is een klassieke reumaremmer. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van sulfasalazine

Sulfasalazine wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis, artritis psoriatica, perifere spondyloartritis en ontstekingsziekten van de darm zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Sulfasalazine kan de oorzaak van uw reumatische aandoening niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. Hierdoor kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten na enige tijd afnemen. Ook heeft het een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. Het kan één tot drie maanden duren voordat u merkt dat sulfasalazine begint te werken. Een nadeel is dat uw afweersysteem geremd wordt waardoor u vatbaarder bent voor infecties.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen optreden.

Meest voorkomend

- Misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, ontsteking mondslijmvlies,
- (Jeukende) huiduitslag, soms met koorts.
- Stemmingswisselingen.
- Oranje verkleuring urine. Dit is onschuldig en gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer hoeft te slikken.

Soms/zelden voorkomend

- Dufheid.
- Erge keelpijn met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (dit zijn tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).
- Stoornissen in de werking van de lever, hier merkt u meestal niets van (wordt meestal aangetoond bij bloedonderzoek).

Wijze van innemen

Sulfasalazine is een medicijn in de vorm van tabletten van 500 milligram en wordt meestal volgens een opbouwschema gebruikt.
Voorbeeld van een dergelijk opbouwschema:

	elke ochtend	**elke avond**
week 1	1 tablet	1 tablet
week 2	2 tabletten	2 tabletten
week 3	2 tabletten	2 tabletten

en zo verder

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd (met voedsel) of met water/melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u de tabletten vergeten hebt in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip dezelfde dag in.

Waarschuwingen

- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: koorts, koude rillingen, ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bijwerkingen (met name bij huiduitslag, erge keelpijn met koorts, herhaaldelijk een bloedneus en snel blauwe plekken).
- Als u veel last hebt van bijwerkingen, dan kunt u stoppen met het gebruik van sulfasalazine. Noteer dan wel op welke dag u bent gestopt en waarom.
- Er zijn enkele medicijnen die de werking van sulfasalazine beïnvloeden, zoals sommige antibiotica, ijzertabletten, digoxine (harttablet) en bloedverdunners waarbij controle via de trombosedienst nodig is (acenocoumarol en fenprocoumon). Informeer uw huisarts, specialist en de trombosedienst daarom altijd welke medicijnen u gebruikt.

Almelo
Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo
Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

facebook.com/ZGTinfo
twitter.com/ZGT_info
linkedin.com/company/zgt
youtube.com/user/ZGTinfo
zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

juli '20

- Als u bekend bent met een allergie voor sulfapreparaten of salicylaten (aspirine-achtigen) mag u geen sulfasalazine gebruiken. Meld dit aan uw reumatoloog.

Controles
Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed laten onderzoeken. In de beginperiode zal dit vaker dan in een later stadium zijn. De uitslag hiervan is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te komen hiervoor. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslagen afwijkend zijn.

Tandheelkundige ingrepen
Sulfasalazine mag u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven innemen. Informeer ook tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met sulfasalazine.

Geplande operaties
Sulfasalazine kunt u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven innemen. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene die de operatie uitvoert alsnog besluiten om sulfasalazine tijdelijk te staken. Het is verstandig om uw reumatoloog tijdig te informeren dat u een operatie moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met sulfasalazine.

Reizen en vaccinaties (inentingen)

Griepvaccinatie
Kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met reumaremmers aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening hiervan wordt zelfs aanbevolen.

Reisvaccinaties
Kunt u veilig laten toedienen indien u naast sulfasalazine géén andere reumaremmers gebruikt.
Let op: bij gebruik van sulfasalazine in combinatie met bepaalde andere reumaremmers (sommige klassieke- en alle biologische reumaremmers) mag u geen ‘levend verzwakte vaccinaties’ toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door bepaalde reumaremmers kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog, reumaverpleegkundige en/of degene die de vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Sulfasalazine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van vrouwen. Bij mannen kan het een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt enkele maanden na het stoppen van het middel. Hoewel sulfasalazine waarschijnlijk veilig is voor het ongeboren kind is het verstandig tijdig met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige te overleggen als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. U kunt beter geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van sulfasalazine, tenzij uw reumatoloog u anders adviseert. Het medicijn wordt namelijk uitgescheiden in de moedermelk.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:
- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:
- zgt.nl/reumatologie

juli ’20

Disclaimer
Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.