

## Het verloop van de Paclitaxel wekelijks /Carboplatin kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit twee medicijnen.

1. Paclitaxel (=taxol)
2. Carboplatin

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
<b>P</b>							<b>P</b>							<b>P</b>							
<b>C</b>																					

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

Om een allergische reactie op paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf aan iedere kuur via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

De totale behandeling duurt ongeveer twee uur. De eerste kuur duurt in verband met langzaam opstarten ongeveer drie en een half uur.

De paclitaxel kuur wordt wekelijks gegeven. De carboplatin kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5°C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal drie à zes weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Spierpijn en /of gewrichtspijn is een veel voorkomende bijwerking die over het algemeen twee tot drie dagen na het infuus optreedt. U mag zo nodig maximaal vier keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten cytostatica kunnen tot dag drie in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan. Indien carboplatin gegeven wordt kunnen cytostatica resten tot dag vijf in het lichaamsvocht aanwezig zijn.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwd, mag u altijd contact met ons opnemen.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt