

## Het verloop van de Paclitaxel /Carboplatin/Trastuzumab/Pertuzumab

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **Paclitaxel** (=Taxol)
2. **Carboplatin**
3. **Trastuzumab** (=Herceptin)
4. **Pertuzumab** (= Perjeta)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Pa</b>							<b>Pa</b>														
<b>C</b>																					
<b>T</b>																					
<b>Pe</b>																					

### Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. Om een allergische reactie op paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige.

De eerste kuur dag één duurt een hele dag. Vanaf kuur twee is dit ongeveer een halve dag. Dag acht duurt gemiddeld twee uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal 4 keer per dag 1000 mg Paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

- Resten cytostatica kunnen tot dag 5 na dag 1 en dag 8 in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

**De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab en Pertuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.**

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.