

## Het verloop van de CHOEP kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vijf medicijnen.

1. **C**yclofosfamide
2. **H**ydroxydaunomycine (= Doxyrubicine)
3. **O**ncovin (=Vincristine)
4. **E**toposide
5. **P**rednison

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C													
H													
O													
E	E	E											
P	P	P	P	P									

### Wijze van toediening:

De medicijnen, behalve de prednison, worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie ZGT. De toediening op dag één duurt ongeveer vier uur. Op dag twee en drie krijgt u alleen de etoposide toegediend en dit duurt ongeveer twee en een half uur. De prednison kunt u zelf thuis innemen, want dit zijn tabletten. U begint hiermee op de ochtend van de chemokuur en slikt dit elke kuur vijf dagen achter elkaar. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de twee weken gegeven.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal drie à zes weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- Door hydroxydaunomycine is tot enkele dagen na de kuur rood verkleuring van de urine en soms het traanvocht mogelijk. Dit is onschuldig. Het kan mogelijk aanleiding geven tot verkleuring van contactlenzen. Het is daarom aan te raden deze de eerste 48 uur na toediening niet te dragen.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de chemokuur veel drinkt (anderhalf tot twee liter).
- Door oncovin is obstipatie (verstopping) na de kuur mogelijk.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw hematoloog.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

- Prednison kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door prednison kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Door prednison kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.
- Resten cytostatica kunnen tot en met dag acht in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.