

## Schema bridging antistolling; Fenprocoumon

Uw behandelend specialist vindt het noodzakelijk dat er een onderzoek wordt verricht. Om dit onderzoek zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat uw bloedverdunners worden gestopt en moet er een overbrugging plaatsvinden met Fragmin (injectie). In deze folder geven wij u hier meer informatie over.

### Voor het onderzoek

Voor de periode zonder Fenprocoumon krijgt u een recept voor een injectie Fragmin (dalteparine). De Fragmin (dalteparine) neemt de werking van de Fenprocoumon tijdelijk over.

De injectie spuit u zoals aangegeven staat in onderstaande schema's. Mocht de dag van het onderzoek wijzigen, dan kunt u de data in het schema aanpassen.

**Naam:**

**Geboortedatum:**

**Datum onderzoek:**

	7 dagen voor scopie	6 dagen voor scopie	5 dagen voor scopie	4 dagen voor scopie	3 dagen voor scopie	2 dagen voor scopie	1 dag voor scopie	Dag van scopie
<b>Datum</b>								
<b>Fenprocoumon</b>	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop	Stop
<b>Fragmin ....IE; Ochtend</b>				1 injectie	1 injectie	1 injectie	1 injectie	X
<b>Fragmin ....IE; Avond</b>				1 injectie	1 injectie	1 injectie	X	

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

### Na de scopie

Uw behandelend specialist geeft na het onderzoek aan wanneer u de Fenprocoumon weer kunt innemen.

Voordat u weer goed ingesteld bent op uw eigen bloedverdunner, kan het nodig zijn nog een aantal dagen Fragmin (dalteparine) injecties te gebruiken.

<b>Herstart Fenprocoumon is afhankelijk van de bevindingen bij het onderzoek en in overleg met trombosedienst en scopierend arts</b>			
	Herstart Fragmin ..... IE  (U moet hiermee doorgaan tot de trombosedienst aangeeft dat u mag stoppen)	08.00 uur  In overleg met scopierend arts	20.00 uur  In overleg met scopierend arts
	Herstart  <input type="checkbox"/> Fenprocoumon	In overleg met scopierend arts	

### Contact met trombosedienst

Het is verstandig dat u de trombosedienst op de hoogte brengt van uw geplande onderzoek en het feit dat u dient te stoppen met uw bloedverdunner.

### Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder?

Neem dan contact op met de polikliniek interne geneeskunde. Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer: 088 708 70 70.

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).