

Het verloop van de Docetaxel / Carboplatin / Trastuzumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **Docetaxel** (=Taxotere)
2. **Carboplatin**
3. **Trastuzumab** (=Herceptin)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
D																				
C																				
T																				

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van de ZGT. De eerste toediening duurt in totaal ruim zes uur. Wanneer met zekerheid is vastgesteld dat u geen klachten heeft gehad van de eerste toediening duren de vervolgcuren ruim drie uur. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de 3 weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zo nodig maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en/of de vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Het komt af en toe voor dat iemand allergisch reageert op deze kuur.
- U kunt vocht vasthouden en daardoor iets in gewicht toenemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De specifieke bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen