

Het verloop van de carboplatin/paclitaxel/pembrolizumab kuur

U begint met een combinatie therapie bestaande uit chemotherapie en immunotherapie. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. **C**arboplatin
2. **P**aclitaxel (=Taxol)
3. **P**embrolizumab (immunotherapie)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C																				
P																				
P																				

Wijze van toediening:

De medicijnen worden u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. Om een allergische reactie op paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf via het infuus medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De totale toediening duurt ongeveer zes uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloeduitslagen om de drie weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Bij klachten van flinke toename kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, diarree of abnormale hoeveelheid en aantal ontlastingen, bloed bij de ontlasting, maagpijn, huiduitslag, wazig of dubbel zien, verminderde kracht, toename vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte, gevoelloosheid of flinke tintelingen in de vingers en voeten, gedragsverandering, donkere urine en/of snelle onregelmatige hartslag (zie waarschuwingskaartje).
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zo nodig maximaal vier keer per dag 1000 mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is van tijdelijke aard en begint meestal twee á drie weken na de eerste toediening. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventuele pruik kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten chemotherapie kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwd mag u altijd contact met ons opnemen.