

Abatacept (Orencia®) per infuus

Uw reumatoloog heeft u abatacept voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Dit is een biologische reumaremmers. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van abatacept

Abatacept wordt gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis. Het geneesmiddel kan de oorzaak van uw reumatische aandoening niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. Abatacept voorkomt de activatie van bepaalde ontstekingscellen ("T-cellen") die bij reumatoïde artritis mede verantwoordelijk zijn voor de gewrichtsontstekingen. Daardoor verminderen de ontstekingen en kunnen klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten na enige tijd afnemen. Ook heeft het een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. Het kan enkele weken duren voordat u merkt dat abatacept begint te werken. Een nadeel is dat uw afweersysteem geremd wordt waardoor u vatbaarder bent voor infecties.

Mogelijke bijwerkingen abatacept

Tijdens de behandeling met abatacept kunnen bijwerkingen optreden.

Meest voorkomend

- Hoofdpijn, duizeligheid, buikpijn, misselijkheid, diarree en vermoeidheid.
- Milde infecties zoals verkoudheid, griep en blaasontsteking.

Zelden voorkomend

- Bloeddrukverhoging, blozen of opvliegers.
- Overgevoelighedsreacties zoals al dan niet jeukende huidafwijkingen, moeilijk ademhalen, pijn op de borst, rillerigheid of lage bloeddruk (treden meestal op bij de eerste of tweede toediening). Om deze verschijnselen te verminderen kan de arts besluiten de snelheid van de toediening te verlagen of bepaalde

medicijnen toe te dienen. Bij ernstigere verschijnselen wordt de toediening vaak gestopt.

- Ernstige infecties.

Wijze van toediening

Abatacept wordt toegediend via een infuus in de arm. Dit duurt ongeveer één uur en vindt in ZGT locatie Almelo plaats op de afdeling dagopname (routenummer 1.4) en in ZGT locatie Hengelo op afdeling kort verblijf (routenummer 1.18). Het infuus blijft na toediening nog een uur zitten, om eventuele overgevoelighedsreacties zo nodig snel te kunnen behandelen. Daarna wordt het infuus verwijderd en kunt u naar huis. Twee en vier weken na het eerste infuus krijgt u opnieuw een toediening. Daarna wordt abatacept elke vier weken toegediend. Als abatacept bij u goed werkt dan kan het voor onbepaalde tijd worden gegeven.

Waarschuwingen

- Voordat u met de medicatie mag starten wordt u eerst onderzocht op tuberculose en hepatitis B.
- Neem voor iedere toediening altijd de "patiëntvragenlijst voor toediening biologicals" door zodat u weet of u abatacept toegediend mag krijgen. Neem minimaal één dag voor de geplande datum van het infuus contact op met de polikliniek indien het infuus om welke reden dan ook afgezegd moet worden.
- Neem contact op met uw reumatoloog of huisarts bij: koorts, koude rillingen, ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bijwerkingen.
- Gebruik géén biologische reumaremmers tijdens het gebruik van antibiotica, koorts

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

of ernstige infectie. Maak eerst de kuur af en wacht totdat de koorts of ernstige infectie weg is en u zich weer goed voelt.

Tandheelkundige ingrepen

Abatacept mag u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep meestal blijven gebruiken. Informeer ook tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met abatacept.

Geplande operaties

Abatacept mag u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven gebruiken. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene die de operatie uitvoert alsnog besluiten om abatacept tijdelijk te staken. Het is verstandig dat uw reumatoloog in het laatste geval op de hoogte gesteld wordt. Informeer ook tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met abatacept.

Reizen en vaccinaties (inentingen)

Griepvaccinatie

Kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met reumaremmers aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening hiervan wordt zelfs aanbevolen.

Reisvaccinaties

Heeft u een reis naar een (tropisch) land in de planning waarvoor reisvaccinaties nodig zijn (denk aan gebieden als Afrika en Zuid-Amerika) of gaat u naar een land zonder goede medische en hygiënische voorzieningen? In dat geval is het verstandig om uw reumatoloog of reumaverpleegkundige tijdig (zo mogelijk minimaal één jaar van tevoren) hiervan op de hoogte te stellen. Het reizen naar landen waarvoor toediening van een 'levend verzwakte vaccinatie' vereist is of waar bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC (tuberculose) en gele koorts voorkomen, wordt afgeraden. Tijdens het gebruik van bepaalde reumaremmers (sommige klassieke-

en alle biologische reumaremmers) mag u geen 'levend verzwakte vaccinaties' toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door reumaremmers kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog, reumaverpleegkundige en/of degene die de vaccinaties zal toedienen kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Neem tijdig contact op (minimaal drie maanden voordat u zwanger wilt worden) met uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om te overleggen of abatacept invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen), het ongeboren kind, de zwangerschap zelf en borstvoeding. Indien u tijdens het gebruik van abatacept onverwacht zwanger wordt neem dan contact op met uw reumatoloog of huisarts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of bezoek onze website.

Telefoonnummer polikliniek reumatologie:

- 088 708 34 03

Website afdeling reumatologie:

- zgt.nl/reumatologie

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.