

Pentamidine verneveling

Uw behandelend specialist heeft u het medicijn pentamidine voor verneveling voorgeschreven. In deze folder leest u daar meer over.

Wanneer krijgt u pentamidine voor verneveling?

Pentamidine voor verneveling is een antibioticum dat voorgeschreven wordt ter voorkoming van Pneumocystis Jirovecii Pneumonie (PJP). Dit is een longontsteking die kan optreden bij patiënten met een verstoring van het immuunsysteem door behandeling of ziekte. U krijgt pentamidine verneveling als u geen cotrimoxazol toegediend kan krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u overgevoelig bent voor cotrimoxazol. U krijgt pentamidine verneveling één keer per maand. De duur van de behandeling wordt door uw specialist met u besproken. Vernevelen met pentamidine kan soms hoestbuien en kortademigheid veroorzaken. Ter voorkoming daarvan krijgt u voor de pentamidine verneveling een verneveling met salbutamol.

Hoe wordt pentamidine voor verneveling toegediend?

U krijgt de pentamidine verneveling in een speciale goed geventileerde ruimte op afdeling 5 West, locatie Almelo. Herhaaldelijke blootstelling aan pentamidine kan schadelijk zijn voor gezonde mensen. Als er een begeleider bij u in de kamer verblijft, krijgt deze beschermende kleding van de verpleegkundige.

Vorbereiding

U hoeft thuis geen speciale voorbereiding te treffen. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Het vernevelen

De verpleegkundige geeft u instructies over het gebruik van de vernevelaar. Het is belangrijk dat u de vernevelaar pas aanzet als de verpleegkundige de kamer heeft verlaten.

Hou het mondstuk van de vernevelaar in uw mond en adem rustig in en uit. Tijdens de verneveling beweegt u de vernevelaar af en toe zachtjes heen en weer zodat alle medicijnen goed verneveld worden. Probeer u tijdens het vernevelen goed rechtop te zitten en regelmatig diep te inhaleren. Zo werken de ventolin en pentamidine het beste.

De verneveling is klaar als het reservoir van het vernevelapparaat leeg is. Er komt geen stoom meer uit. In totaal duurt de behandeling ongeveer een uur. Zet aan het eind van de verneveling, of als er vragen of problemen zijn, de vernevelaar uit voordat u de verpleegkundige roept.

Bijwerkingen

- Tijdens het vernevelen kan irritatie optreden in uw mond of keel. Spoel uw mond met water. Slik het niet door maar spuug uit in een bekertje dat u van de verpleegkundige krijgt;
- Moet u hoesten of heeft u last van slijmvorming? Slik het dan niet door maar spuug het uit in een doekje of bekertje;
- De verneveling kan hoestbuien en kortademigheid veroorzaken. Om deze reden wordt vooraf verneveld met salbutamol. Mochten toch klachten optreden dan kunt u de verneveling even stop zetten. Wordt u onzeker of erg benauwd, waarschuw dan de verpleegkundige;
- Metaalsmaak;
- Duizeligheid;

Bijwerkingen van het vernevelen zijn meestal na enkele uren weer over.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Nazorg

Rookt u? Doe dit pas na twee uur na het vernevelen met pentamidine. Het roken kan lokale reacties van de bovenste luchtwegen versterken.

Toediening thuis

De eerste verneveling vindt altijd plaats in het ziekenhuis. Als dit goed is verlopen, vinden volgende toedieningen thuis plaats. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. U krijgt vernevelapparatuur en uitleg aan huis en er zijn speciale verpleegkundigen bereikbaar voor het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen.

Thuis hoeven geen beschermende maatregelen voor de omgeving toegepast te worden omdat er voor thuisgebruik andere vernevelapparatuur beschikbaar is. De pentamidine en salbutamol haalt u na een bezoek aan uw specialist op bij de apotheek in het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen, neem dan contact op met ZGT via onderstaande telefoonnummers:

Dagbehandeling Oncologie ZGT;
Telefoonnummer 088 708 35 64

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.