

Gemcitabine blaasspoeling

Inleiding

Zoals uw arts met u besproken heeft, is er in uw blaas een blaastumor (poliep) geconstateerd. Hoewel deze poliepachtige tumoren in principe kwaadaardig zijn, blijven zij vaak beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen zij door middel van een kleine operatie door de plasbuis in hun geheel verwijderd worden. Echter bij een deel van de patiënten zullen ze terugkeren, waarbij ze soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat deze poliepen terugkomen te verkleinen. Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Welk middel noodzakelijk is, wordt in uw geval zorgvuldig door uw arts bepaald. Eén van die middelen is het cytostaticum (celdodend middel) Gemcitabine.

Schema toediening

Er zijn twee schema's. De eerste is het opstartschema (inductie); dit schema houdt in dat u de eerste zes weken iedere week het middel met behulp van een blaaskatheter toegediend krijgt.

Vijf maanden lang zal iedere maand een toediening plaatsvinden. Daarna is in principe de behandeling klaar en zal er regelmatig een blaasonderzoek gedaan worden ter controle. De uroloog bepaalt of verdere spoelingen noodzakelijk zijn.

Vorbereiding

Voor elke nieuwe blaasspoeling wordt u gevraagd naar de eventuele bijwerkingen. Indien bij u een infectie wordt geconstateerd, wordt de spoeling uitgesteld. Het is belangrijk om vier uur voor de blaasspoeling niet of weinig te drinken. Indien u diuretica

(plastabletten) gebruikt, neemt u deze op de dag van de spoeling ná de behandeling en niet ervoor.

Toediening

Op de dag van de blaasspoeling kijkt de verpleegkundige de urine na of er geen ontsteking in de blaas zit.

Op de Dagbehandeling Oncologie krijgt u een labformulier en urinepotje mee. De urine levert u een uur voor de blaasspoeling in bij het laboratorium in het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundige beoordeelt de uitslag. Voor de eerste blaasspoeling geeft de urologieverpleegkundige u een labformulier en urinepotje mee.

Daarna wordt er door de verpleegkundige een katheter (slangetje) in de blaas gebracht en de eventueel resterende urine wordt opgevangen. Hierna wordt het medicijn via de katheter in de blaas gebracht waarna de katheter verwijderd wordt. U moet proberen het medicijn minimaal één uur en maximaal twee uur in de blaas te houden. Drink tijdens deze twee uur ook niets. Indien u stil zit of ligt adviseren wij u regelmatig van houding te wisselen. U plast nadien uit op een aangewezen toilet.

Na de blaasspoeling

De eerste twee uur na de toediening van de blaasspoeling mag u niets drinken. Tijdens de eerste blaasspoeling plast u uit in het ziekenhuis op een door een verpleegkundige aangewezen toilet. Als het uitplassen geen problemen oplevert mag u de volgende keren direct na de toediening van de blaasspoeling naar huis en plast u thuis uit op het toilet. Mannen moeten zittend plassen om spatten te voorkomen. Spoel het toilet tweemaal door met een gesloten deksel. Was na het uitplassen zorgvuldig uw handen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Nazorg

Probeer u gedurende 48 uur extra veel te drinken; anderhalf tot twee liter per 24 uur. De eerste twee dagen na de spoeling moet de urine als mogelijk besmet worden beschouwd. Daarom adviseren wij u behalve de maatregelen die we hierboven al genoemd hebben, nog een aantal beschermende maatregelen te nemen. Vermijd huidcontact met de uitgeplaste vloeistof. Indien er toch huidcontact plaatsvindt, moet u de huid goed spoelen met veel water en daarna wassen met zeep (PH-neutraal). Het toilet dient dagelijks te worden schoongemaakt met een PH-neutrale zeep (groene zeep) of allesreiniger. Gebruikt u de eerste 48 uur geen toiletblokjes. Indien u tijdens het urineren, urine buiten het toilet morst moet u de omgeving reinigen met een PH-neutrale zeep (groene zeep) of allesreiniger en met koud water (juist het koude water neemt cytostaticarestjes op). Eventueel met besmette kleding en ondergoed eerst met koud water voorwassen en daarna wassen met het normale wasprogramma.

Geslachtsgemeenschap

Wij adviseren om de eerste twee dagen na de spoeling bij geslachtsgemeenschap een condoom te gebruiken.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas. Het betreft zeer frequente aandrang om te plassen, een pijnlijk of branderig gevoel in de plasbuis, moeite met ophouden van de urine, bloed of weefseldeeltjes in de urine. Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen de dag na de spoeling weer verdwenen.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen, neem dan op werkdagen tijdens

kantooruren contact opnemen met onderstaande telefoonnummers.

Bij vragen en acute gevallen zoals bij koorts boven 38.5°C neemt u tijdens kantooruren contact op met:

- Polikliniek urologie telefoonnummer: 088 708 33 90

In acute gevallen zoals bij koorts boven 38.5°C neemt u buiten kantooruren contact op met:

- Afdeling 5 west / oncologie, telefoonnummer: 088 708 34 20

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.