

Lage bloeddruk bij het staan

Orthostatische Hypotensie

Orthostatische Hypotensie (OH)-test

Binnenkort ondergaat u een Orthostatische Hypotensie (OH)-test. Bij dit onderzoek meten we met behulp van een bloeddrukmeter de wisselingen in uw bloeddruk.

Uit de gegevens kan worden vastgesteld of er sprake is van een te sterke bloeddrukdaling bij verandering van houding, bijvoorbeeld van zitten of liggen naar staan.

Wat is een OH-test?

(OH)-test staat voor Orthostatische Hypotensietest. Dat is een onderzoek dat wisselingen van uw bloeddruk registreert. Na een periode op de onderzoeksbank te hebben gelegen, wordt uw bloeddruk aan beide armen met een automatische bloeddrukmeter gelijktijdig gemeten. Totdat uw bloeddruk stabiel is, kan dit een aantal keren herhaald worden. Volgend uit de meetwaarden wordt aan één arm de meter weggehaald, U wordt gevraagd te gaan staan en vervolgens wordt, per minuut, gedurende enkele minuten uw bloeddruk gemeten aan de andere arm.

Vorbereiding

U hoeft zich op dit onderzoek niet speciaal voor te bereiden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal vijftien tot dertig minuten.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling klinische neurofysiologie ziekenhuislocatie Hengelo, telefoonnummer 088 708 54 16.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt