

Onderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileiders

HSG (hysterosalpingografie)

Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van foto's verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Bij het maken van deze foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld. Vervolgens wordt de uitslag vastgelegd in een verslag.

Wanneer moet u bellen?

Wanneer u via de fertiliteitskliniek komt en een afspraak voor HSG wilt maken, belt u de afdeling radiologie op de **eerste** dag van uw menstruatie. Zij plannen dan in overleg met het secretariaat van de gynaecologen een afspraak voor een HSG. Als uw menstruatie in het weekend valt, kunt u op maandagmorgen bellen.

Komt u voor een controle van een Essure procedure (sterilisatiemethode) dan krijgt u een afspraakbevestiging thuis gestuurd.

Belangrijk om te weten

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden vóór het onderzoek. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Vorbereiding

Met uw gynaecoloog is afgesproken het onderzoek te laten plaatsvinden acht tot elf dagen na het begin van de menstruatie. U kunt desgewenst twee uur tevoren een pijnstiller slikken (Paracetamol / Ibuprofen) die u normaal ook mag gebruiken.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de kamer waar het onderzoek zal plaatsvinden. Uw partner kan bij u blijven. In een kleedkamer moet u het onderlichaam bloot maken. U ligt op een onderzoekstafel met de benen in

de beensteunen, zoals bij een inwendig gynaecologisch onderzoek. De gynaecoloog brengt een speculum in om de opening van de baarmoedermond zichtbaar te maken. Er wordt een slangetje in de baarmoedermond geplaatst. Aan het uiteinde van het slangetje zit een ballonnetje dat met lucht gevuld wordt, zodat het slangetje goed op de plaats blijft zitten. Terwijl de gynaecoloog de contrastvloeistof via het slangetje spuit, kijkt de radioloog onder doorlichting en maakt röntgenfoto's. Dit kan een gevoel van kramp geven in de onderbuik.

Na afloop van het onderzoek

Na het onderzoek kunt u last hebben van buikpijn, zoals tijdens de menstruatie. Ook kunt u wat bloedverlies hebben. Het is voor u prettig een begeleider mee te nemen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Uitslag

De gynaecoloog vertelt u de voorlopige uitslag.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.