

Het verloop van de Capecitabine kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit één medicijn.

1. Capecitabine (= Xeloda)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca							
Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca							

Wijze van toediening:

Capecitabine wordt in tabletvorm voorgeschreven en kunt u zelf thuis innemen. U neemt de tabletten zowel 's ochtends als 's avonds in, gedurende veertien dagen. Daarna volgt een rustperiode van zeven dagen waarin geen Capecitabine wordt ingenomen. De volgende kuur start in principe drie weken na dag één als de bloedsuitslagen goed zijn.

Wijze van inname:

- Neem de Capecitabine in met een interval van twaalf uur.
- Neem de Capecitabine in binnen dertig minuten na iets gegeten te hebben.
- Slik de Capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water
- Als u om medische redenen de tabletten niet heel kunt doorslikken dan kunnen de tabletten bij uitzondering en in overleg met en na instructie door uw behandelend specialist en apotheker worden vergruisd en/of worden opgelost.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan is voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Bijwerkingen:

Neem direct contact op met het ziekenhuis indien één van de volgende symptomen optreedt:

- Koorts boven de 38,5°
- Diarree, als u elke dag een toename van vier of meer ontlastingen heeft in vergelijking tot uw normale ontlastingspatroon, of als u 's nachts diarree heeft;
- Pijn op de borst, vooral als dit tijdens inspanning optreedt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- Misselijkheid en verlies van eetlust. Gebruik frequent kleine maaltijden;
- Braken;
- Vermoeidheid;
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en vier keer per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen;
- Hand-voet huidreactie: de handpalmen en voetzolen kunnen rood verkleuren, verschilferen, het ontstaan van kloofjes en een pijnlijk of tintelend gevoel. Het is zinvol uw handen en voeten twee keer per dag in te smeren met een vette crème. Probeer knellend schoeisel te vermijden;
- Tijdens en het gebruik van en tot 48uur na de laatste capecitabine wordt een zeer kleine hoeveelheid van het geneesmiddel uitgescheiden via lichaamsvloeistoffen, voornamelijk via uw urine. U hoeft zelf als patiënt geen beschermende maatregelen te nemen, maar voor familie en verzorgenden worden wel hygiënische voorzorgsmaatregelen noodzakelijk geacht als zij in direct contact kunnen komen met bijvoorbeeld urine, ontlasting of braaksel. Bij contact met urine, ontlasting of braaksel adviseren wij verzorgenden/naasten wegwerphandschoenen te dragen.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Polikliniek oncologie: 088 708 70 76 ziekenhuislocatie Almelo
 088 708 70 75 ziekenhuislocatie Hengelo

Buiten kantoortijden via afdeling 5 west: 088 708 34 20

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.