

Flebografie

Uw behandelend specialist heeft u voor onderzoek van uw bloedvaten in uw arm of been verwezen naar de afdeling radiologie.

Voor deze procedure wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is afhankelijk van het onderzoek en behandeling en is vooraf met u besproken. De procedure vindt plaats op het OK complex.

Belangrijk om te weten

Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.

Overgevoeligheden

Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor het onderzoek. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Vorbereiding bij verminderde nierfunctie/ andere risicofactoren

Indien er sprake is van een verminderde nierfunctie, en/of in combinatie met risicofactoren wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de contrastnefropathie polikliniek. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen via de bloedbaan leiden tot een acute vermindering van nierfunctie, ook wel contrastnefropathie genoemd.

Tijdens het polikliniekbezoek wordt uitleg gegeven over de eventuele te nemen voorzorgsmaatregelen. Hieronder valt het afspreken van een spoelschema met infuusvloeistof voor- en na de procedure, eventueel tijdelijk stoppen van specifieke medicijnen en controle van de nierfunctie 3 tot 7 dagen na de procedure.

Dieet

- Tot 2½ uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt gebruiken: 1 snee brood of 2 beschuiten met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Kleding

Aangezien de procedure plaatsvindt op het OK complex is het niet toegestaan om tijdens de procedure een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan. Tijdens en de eerste uren na de procedure heeft u geen ondergoed aan. Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen. Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de procedure wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen. Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de procedure

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten. Het streven is om u anderhalf uur na opname te behandelen echter kan het tijdstip uitlopen i.v.m. spoed patiënten. U wordt in een bed naar het OK complex gebracht. Daar wordt u ontvangen door gespecialiseerde verpleegkundigen. Gedurende het verblijf op het OK complex

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole (Patiëntenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure)

In de ontvangstruimte van het OK complex wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht.

U wordt door interventielaboranten opgehaald, zij zullen u meenemen naar de interventiekamer.

Tijdens de procedure bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

Tijdens de procedure wordt u toegedekt met steriele lakens.

De interventieradioloog maakt een kleine opening in de huid en prikt de ader aan. Vervolgens brengt hij een werkbuisje in. Door dit werkbuisje worden de katheters en/of materialen ingebracht die hij nodig heeft. Om anders zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt röntgendoorlichting en een contrastmiddel. Na het inspuiten van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen of het gevoel hebben dat u plast, dit gevoel verdwijnt meestal binnen een minuut. Vervolgens worden foto's gemaakt, u krijgt nauwkeurige instructies tijdens het maken van deze foto's.

Onderzoek bloedvaten benen

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel die kan worden gekanteld. U wordt in half staande houding gebracht. Om dieper gelegen aders zichtbaar te maken wordt om uw enkel(s) een stuwband aangebracht. De interventieradioloog zal een ader op uw voetrug aanprikken.

Onderzoek bloedvaten arm

Wanneer de aders van uw arm worden onderzocht bevestigt de interventielaborant een stuwband om uw pols(en). De interventieradioloog spuit de contrastvloeistof in een bloedvat op uw handrug.

Duur

De duur van het onderzoek is soms moeilijk te voorspellen maar doorgaans duurt het onderzoek 60 minuten.

Na afloop van het onderzoek

De aanprikplaats wordt door de interventieradioloog kortdurend dichtgedrukt.

Op de afdeling

Na de procedure wordt u door de interventielaborant overgedragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen van de uitslaapkamer. Zij dragen u over aan de verpleegkundigen van de verpleegafdeling.

Complicaties

Geen enkel 'invasief' onderzoek is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens of na een dotterbehandeling complicaties optreden.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend bent met overgevoeligheid voor jodium moet u contact opnemen met uw behandelend specialist. Men kan hier rekening mee houden en tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen toedienen.
- Ter plaatse van de aanprikplaats kan een blauwe plek ontstaan. Dit is vervelend, maar het trekt na verloop van tijd vanzelf weg.
- Door het aanprikken van een ader is er een kleine kans op het ontstaan van een tromboflebitis. Hierbij is de ader rondom de aanprikplaats ontstoken en heeft zich een bloedstolsel gevormd. Een tromboflebitis wordt behandeld met medicijnen.
- Zeer zelden ontstaat een (long) embolie, hiervoor is een ziekenhuisopname nodig.

Controleafspraak

U krijgt een afspraak thuisgestuurd voor controle na 2 weken op de polikliniek.

Vervoer

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen.

Instructies voor thuis

De volgende regels worden aanbevolen na uw ontslag

- U kunt zich thuis douchen.
- De wond mag echter niet "verweken". Daarom mag u de eerste vier dagen na de behandeling geen bad nemen en niet gaan zwemmen.
- Verwijder de pleister de volgende dag. Maak de huid schoon met milde zeep en water. Tevens de wond voorzichtig afdrogen.

Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- De voet/hand, been/ arm erg gevoelig/pijnlijk is.
- De voet/ hand, been/ arm dikker wordt.
- U huiduitslag heeft.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat vaatchirurgie, telefoon 088 708 52 43.

Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoon 088 708 78 78.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via secretariaat vaatchirurgie, telefoon 088 708 52 43.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.