

## Nierdrain wisselen met opname

Uw specialist heeft u voor het wisselen van uw nierdrain verwezen naar de afdeling radiologie. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis. De opnameduur is afhankelijk van de behandeling en is vooraf met u besproken maar meestal kunt u 2 uur na de behandeling weer naar huis. Het wisselen van uw drain vindt plaats op de afdeling radiologie.

Op de dag van opname meldt u zich bij de gastenservice, receptie hoofdingang locatie Almelo. Datum en tijdstip wordt u per post toegestuurd.

### Verhinderend

Wanneer u op de behandeldatum of het tijdstip verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Secretariaat radiologie, telefoonnummer: 088 708 37 00.

### Zwangerschap

Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór de behandeling melden.

### Vorbereiding

#### Dieet

Tot 1/2 uur voor het melden bij de gastenservice mag u nog een licht ontbijt/lunch gebruiken:

- 1 snee brood of 2 beschuitjes met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

### Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft uw aanvragend specialist u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u Plavix (clopidogrel) in combinatie met Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium)

gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met Plavix.

- Als u Brilique (ticagrelor) in combinatie met Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u 5 dagen voor de behandeling te stoppen met Brilique (ticagrelor).
- Als u Ascal of Aspirine (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u Plavix of Grepid (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u Brilique (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u Sintrom (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier 3 dagen voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u Marcoumar (fenprocoumon) gebruikt, dient u hier 7 dagen voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u Pradaxa (dabigatran) gebruikt, dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u Xarelto (rivaroxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u Eliquis (apixaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Als u Lixiana (edoxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen tenzij anders voorgeschreven.

### Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een radioloog geassisteerd door een radiodiagnostisch laborant. U wordt in bed naar de afdeling radiologie gebracht. U wordt verzocht op de behandeltafel plaats te nemen. Afhankelijk van de intreeplaats van uw drain wordt u in buikligging of zijligging gelegd.

Aangezien steriel werken belangrijk is zal de entreeplaats van de drain en de huid om de entreeplaats ontsmet worden. Ook wordt u toegedekt met steriele doeken.

Onder doorlichting zal de radioloog via de bestaande drain een voerdraad inbrengen.

Vervolgens zal de radioloog over deze draad de bestaande drain verwijderen en de nieuwe drain inbrengen. De radiodiagnostisch laborant zal de drain op uw huid bevestigen en aan een urinezak bevestigen.

Na het onderzoek wordt u weer opgehaald en naar de verpleegafdeling gebracht. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis.

### Duur

De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.

### Nazorg

Afhankelijk van het type drain die u heeft gekregen, kan deze 3 of 6 maanden in uw nier blijven. Indien u na deze periode nog steeds een drain nodig heeft zorgt uw aanvragend specialist voor een nieuwe verwijzing voor de drainwissel. De afspraakbevestiging wordt u ter zijne tijd toegestuurd. Het verzorgen van de drain wordt in overleg met uw specialist besproken. De afspraakbevestiging zal u ter zijne tijd toegestuurd worden.

### Neem contact op indien

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger).
- U huiduitslag krijgt.
- De kleur van uw urine veranderd naar rood.
- De drain geen urine uitscheidt.

Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat urologie: 088 708 33 90.

Buiten kantoor tijden kunt u bij deze klachten en/of andere klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bellen met de spoedeisende hulp van ZGT: 088 708 78 78.

### Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen deze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar via secretariaat urologie: 088 708 33 90.

### Lees ook

- Folder Opname
- Folder rechten en plichten

### Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer info op: [www.zgt.nl/mijnzgt](http://www.zgt.nl/mijnzgt).