

Lokalisatie van de tumor bij borstkanker (d.m.v. een draadje)

Inleiding

Met u is besproken dat in uw borst een draadje geplaatst gaat worden. De afwijking in uw borst is namelijk te klein om voelbaar te zijn tijdens de operatie waarbij de tumor verwijderd wordt. Dit draadje markeert de precieze plaats van de tumor in uw borst.

Dit is een algemene folder. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Belangrijk om te weten

- Voor dit onderzoek mag u geen bodylotion, crème of talkpoeder gebruiken op uw borst(en).
- Zwangerschap: röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek melden.

Verloop van het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit, geassisteerd door twee laboranten. Er zijn twee mogelijkheden om de tumor goed in beeld te brengen, zodat de radioloog het draadje op de juiste plaats in de borst kan inbrengen:

Meestal kan dit met behulp van echografie en anders met een speciaal mammografieapparaat.

1. *Inbrengen met behulp van echografie.*

Met een echo wordt de afwijkende plek in de borst bepaald. De plaats waar de dunne naald wordt ingebracht wordt eerst gedesinfecteerd. Daarna wordt de verdachte plek aangeprikt. Dit kan even gevoelig zijn. In de naald zit een draadje. Aan het uiteinde dat in de borst komt, zit een klein 'haakje', dat de draad op

zijn plaats houdt. De naald wordt uit de borst verwijderd en het andere uiteinde van het draadje steekt uit uw borst.

2. *Inbrengen met behulp van een speciaal daarvoor gemaakt mammografieapparaat.*

U komt op uw buik op een tafel te liggen. In deze tafel zit een opening waar de borst in komt te liggen. De borst wordt platgedrukt door middel van een plaatje dat de borst gedurende het onderzoek op zijn plaats houdt.

De laborant maakt vervolgens röntgenfoto's van de borst. Hierna kan de radioloog door middel van de computer de plaats van de afwijking bepalen en de exacte positie voor de naald. De plaats waar de dunne naald wordt ingebracht wordt eerst gedesinfecteerd. Daarna wordt de verdachte plek aangeprikt. Dit kan even gevoelig zijn. In de naald zit een draadje. Aan het uiteinde dat in de borst komt, zit een klein 'haakje', dat de draad op zijn plaats houdt. De naald wordt uit de borst verwijderd en het andere uiteinde van het draadje steekt uit uw borst

Vervolgens worden bij beide procedures ter controle nog twee röntgenfoto's gemaakt. Als het draadje op de goede plek zit, wordt het vrije uiteinde van het draadje op de huid vastgeplakt. Daarna kunt u terug naar de verpleegunit in afwachting van de operatie.

Het is belangrijk dat u probeert uw arm zo min mogelijk te bewegen. Dit om te voorkomen dat het draadje verschuift.

3. Tot slot

Beide methoden zorgen ervoor dat de chirurg in staat is om tijdens de operatie het draadje en dus de afwijking terug te vinden en te verwijderen.

Er wordt altijd ter controle een foto gemaakt van het stukje borstweefsel dat verwijderd is. Dit is om te kijken of de tumor werkelijk is verwijderd.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.