

Inbrengen centraal infuus (PICC-lijn)

Uw specialist heeft u voor het plaatsen van een PICC-lijn verwezen naar de afdeling radiologie.

Een PICC-lijn is een centraal infuus waardoor bloed afgenomen, of medicijnen toegediend kan worden. De behandeling vindt plaats op de OK.

Belangrijk om te weten

- **Zwangerschap** Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of denkt te zijn, moet u dit voor het onderzoek melden.
- **Overgevoeligheden** Heeft u last van astma, hooikoorts of bronchitis, of bent u overgevoelig voor medicijnen, jodiumhoudende contrastvloeistof of andere stoffen, wilt u dit dan melden voor het onderzoek. Uw behandelend specialist heeft daar al met u over gesproken.

Vorbereiding bij verminderde nierfunctie

Bij patiënten met een verminderde nierfunctie kan toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen via de bloedbaan leiden tot een acute vermindering van nierfunctie, ook wel contrastnefropathie genoemd.

Tijdens het polikliniekbezoek wordt uitleg gegeven over de eventuele te nemen voorzorgsmaatregelen. Hieronder valt het afspreken van een spoelschema met infuusvloeistof voor- en na de behandeling, eventueel tijdelijk stoppen van specifieke medicijnen en controle van de nierfunctie 3 tot 7 dagen na de behandeling.

Dieet

- Tot een half uur voor het melden bij de receptie mag u nog een licht ontbijt gebruiken: 1 snee brood of 2 beschuitjes met beleg.
- 1 kop thee, koffie.

Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Dan graag aandacht voor onderstaande. Heeft de arts u andere voorschriften gegeven, dan is het van belang dat u zich aan deze voorschriften houdt.

- Als u **Plavix** of **Grepid** (clopidogrel) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt kan u deze blijven doorslikken.
- Als u **Plavix** of **Grepid** (clopidogrel) in combinatie met **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met de **Plavix/Grepid**.
- Als u **Brilique** (ticagrelor) in combinatie met **Ascal** of **Aspirine** (acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium) gebruikt dient u **5 dagen** voor de behandeling te stoppen met **Brilique** (ticagrelor)
- Als u **Sintrom** (acenocoumarol) gebruikt, dient u hier **3 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Marcoumar** (fenprocoumon) gebruikt, dient u hier **7 dagen** voor de behandeling mee te stoppen.
- Als u **Pradaxa** (dabigatran) gebruikt, dient u hier 24uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Xarelto** (rivaroxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

- Als u **Eliquis** (apixaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.
- Als u **Lixiana** (edoxaban) gebruikt dient u hier 24 uur voor de behandeling mee te stoppen. Dit in overleg met uw aanvragend specialist.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen tenzij anders is voorgeschreven.

Bij gebruik van **Sintrom, Marcoumar** wordt bij uw opname bloed afgenomen.

Heeft u vragen over de medicijnen die u gebruikt dan kunt u altijd contact opnemen met uw aanvragend specialist.

Kleding

Aangezien de behandeling plaatsvindt op de OK is het niet toegestaan om tijdens de behandeling een eigen pyjama te dragen. Van de verpleegkundige krijgt u bij uw opname een operatiejasje aan.

Mocht u snel last van koude voeten hebben, kunt u sokken meebrengen.

Aangezien uw zuurstofgehalte in het bloed tijdens de behandeling wordt gecontroleerd, vragen wij u nagellak/ kunstnagels van 1 hand te verwijderen. Sieraden kunt u het beste thuis laten.

Verloop van de behandeling

U wordt behandeld door een interventieradioloog geassisteerd door interventielaboranten.

Het streven is om u anderhalf uur na opname te behandelen. Echter kan het tijdstip uitlopen in verband met spoed patiënten. U wordt in een bed naar de OK gebracht. Gedurende het verblijf op de OK wordt u meerdere keren vragen gesteld, dit in verband met de veiligheidscontrole.

U kunt op onze website meer lezen over deze veiligheidscontrole ZGT.nl (Patientenfolders van ZGT/ Time-Out Procedure) In de ontvangstruimte van de OK wordt in uw arm een infuusnaaldje ingebracht.

Tijdens de behandeling bewaakt de interventielaborant uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.

De aanprikplaats wordt ontsmet en verdoofd, dit kan even gevoelig zijn.

Om infecties te voorkomen is steriel werken erg belangrijk, tijdens de behandeling wordt uw huid ontsmet en krijgt u een steriel laken over borst, buik en benen. De interventieradioloog maakt een kleine opening in de huid en prikt de ader aan. Vervolgens brengt hij een werkbuisje in. Door dit werkbuisje wordt een katheter en een voerdraad ingebracht om de PICC-lijn op de juiste plek te leggen. Na de behandeling wordt het werkbuisje verwijderd en blijft de PICC-lijn achter.

Om aders zichtbaar te maken wordt gebruik gemaakt van röntgendoorlichting en een contrastmiddel. Na het inspuiten van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen of het gevoel hebben dat u plast, dit gevoel verdwijnt meestal binnen een minuut. Vervolgens worden foto's gemaakt, u krijgt instructies tijdens het maken van deze foto's.

Duur

De behandeling duurt doorgaans 30 tot 60 minuten.

Op de afdeling

Na de behandeling gaat u naar de verpleegafdeling. Het tijdstip waarop u naar huis mag, hoort u van de zaalarts. Indien u antistollingsmedicatie gebruikt zal de zaalarts beslissen wanneer u mag herstarten met uw antistollingsmedicatie.

Complicaties

Geen enkel invasieve behandeling (behandeling waarbij de huid of slijmvliezen worden gepasseerd) is zonder risico's. Zo kunnen ook tijdens of na het inbrengen van een PICC-lijn complicaties optreden.

- Er kan een allergische reactie op het contrastmiddel ontstaan, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend bent met overgevoeligheid voor jodium moet u contact opnemen met uw behandelend specialist. Men kan hier rekening mee houden en tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen toedienen.
- Daarnaast kan na de behandeling een blauwe plek ontstaan ter plaatse van de aanprikplaats. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Instructies voor thuis

De verpleegkundige van de verpleegafdeling geeft u instructies voor thuis mee.

Neem contact op

Neem direct contact op als u 1 (of meerdere) van onderstaande complicaties heeft:

- U koorts krijgt (38,5°C of hoger)
- U huiduitslag heeft.
- De huid rond de PICC-lijn rood wordt.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek/afdeling waar u onder behandeling bent.

Heeft u een van bovenstaande klachten en/of andere klachten en/of vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, dan belt u buiten kantooruren met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Medische apparatuur (zoals een insulinepomp)

Gebruikt u een medisch apparaat zoals een insulinepomp of (externe) neurostimulator? Er bestaat een kleine kans dat de werking van het apparaat verstoord raakt door

blootstelling aan röntgenstraling. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien hoe u hiermee om moet gaan.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar via het secretariaat van de polikliniek/afdeling waar u onder behandeling bent.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet.

Kijk voor meer info op: www.zgt.nl/mijnzgt.