

Pleurodese

Inleiding

U bent opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van een klaplong (pneumothorax) of vocht (pleuravocht) tussen de longvliezen, ook wel 'vocht achter de longen' genoemd.

De longarts heeft besloten uw long te 'plakken', dit heet pleurodese. Dit maakt de kans kleiner dat de long weer inklapt, of dat er opnieuw vocht tussen de vliezen komt. In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Wat is pleurodese?

Onder pleurodese wordt verstaan het 'plakken' van de longvliezen.

Dit gebeurt door via de thoraxdrain, die u al eerder heeft gekregen, een vloeistof (talk-oplossing) in te spuiten. Hierdoor zal er een ontstekingsreactie ontstaan, waardoor de longvliezen aan elkaar plakken.

De behandeling

De behandeling zal worden verricht door de specialist of arts-assistent en de verpleegkundige op de afdeling waar u bent opgenomen.

Voorafgaand aan de behandeling, krijgt u pijnstilling toegediend. De arts zal vervolgens via de drain de talk-oplossing inspuiten. De drain wordt óf direct na de behandeling, óf anders meestal de volgende dag verwijderd. In sommige gevallen zal deze verrichting plaatsvinden op de recovery.

Hier wordt dan van tevoren door de anesthesioloog een ruggenprik gegeven om zo voor maximale pijnbestrijding te zorgen.

Na de pleurodese

- Kunt u door de ontstane ontstekingsreactie koorts en/of pijn krijgen;
- Geeft u klachten van eventuele benauwdheid of pijn door aan de verpleegkundige. De verpleegkundige overlegt zo nodig met de arts over de behandeling hiervan;
- Is het van belang dat u goed blijft doorademen, om te voorkomen dat zich slijm zal ophopen in luchtwegen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die bespreken met de verpleegkundige en/of uw longarts.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt