

## Plexus Coeliacus blokkade

In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een Coeliacus blokkade. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

### Wat is een Plexus Coeliacus blokkade?

Een plexus is een netwerk van zenuwen. Het zenuwnetwerk dat aan de achterzijde in de bovenbuikholte ligt, wordt in medische termen "Plexus Coeliacus" genoemd.

Dit zenuwnetwerk is belangrijk voor pijn en kan door blokkades de pijn verminderen. Zoals bij mensen die ernstige pijnklachten hebben als gevolg van kanker van de bovenbuikorganen, bijvoorbeeld de alvleesklier, de maag en de lever. Vaak wordt medicinale alcohol gebruikt om de Coeliacus plexus te blokkeren. Soms kan deze behandeling ook effectief zijn bij alvleesklierontsteking (pancreatitis).

### Belangrijk

Neem contact op met Nocepta indien dit voor u van toepassing is:

- U gebruikt bloedverdunners
- U bent (mogelijk) zwanger.
- U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
- U heeft een pacemaker of ICD.
- U heeft geen pijn meer.
- U bent de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts

### Vorbereiding

- U kunt uw medicatie gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.
- Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.
- Draag makkelijk zittende kleding.
- Indien u insuline afhankelijk bent neemt u zelf de benodigdheden mee om u bloedsuiker te kunnen reguleren, zoals glucosemeter en insuline.

### Nuchterbeleid

U mag van tevoren niet eten en drinken, u moet **nuchter** zijn voor deze behandeling, dit houdt in dat u zich aan de volgende richtlijnen behoort te houden:

- **tot zes uur** voor de behandeling mag u een lichte maaltijd hebben, zoals brood of beschuit met beleg, aangevuld met melkproducten
- **tot twee uur** voor de behandeling mag u heldere vloeistof drinken (aanmaaklimonade, appelsap, thee, bouillon, water)
- **Vanaf 2 uur** voor uw behandeling mag u niets meer eten of drinken
- Voor de behandeling geen alcohol of drugs gebruiken
- Liefst niet roken of (nicotine)kauwgum kauwen; dit vergroot de hoeveelheid maagzuur

### De behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.

U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte. Vervolgens wordt u naar de betreffende ruimte gebracht. Daar zal een infuusnaald worden ingebracht om een slaapmiddel toe te kunnen dienen.

Wanneer het slaapmiddel is ingewerkt, begint de eigenlijke behandeling.

De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat. De huid wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. De naald wordt ingebracht en met behulp van contrastvloeistof wordt de positie van de naald gecontroleerd.

Als de naalden in de juiste positie staan wordt de behandelvloeistof (medicinale alcohol) ingespoten.

### Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de aftercare. Daar zal regelmatig u bloeddruk worden gecontroleerd. In verband met de gebruikte medicatie mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. De pijnspecialist spreekt met u de tijd af wanneer u naar huis mag.

### Behandelingsduur.

De behandeling duurt ongeveer 45 min. U zult tevens 20-30 minuten op de nazorg verblijven. Ieder patiënt reageert verschillend op een behandeling. De nazorg kan hierdoor zowel korter als langer duren.

### Resultaat

Het resultaat van de behandeling is na 1 à 2 dagen pas duidelijk. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de behandeling een goede pijnvermindering op. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk.

U krijgt een afspraak voor controle bij Nocepta.

### Risico's of bijwerkingen

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch bestaat er een kans op het optreden van bijwerkingen en/of complicaties.

- U kunt tijdelijk last hebben van diarree
- Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, in dat geval krijgt u een infuus, waardoor extra vocht gegeven wordt.
- U kunt de eerste weken na de behandeling, bij plotseling rechtop gaan zitten/staan, even duizelig zijn
- Soms kan er een stoornis in de blaasfunctie optreden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk is. Dit komt zelden voor
- Een complicatie die zeer zelden voorkomt is een gedeeltelijke verlamming van de benen (dwarslaesie). De kans hierop is uitermate gering
- Doordat er medicinale alcohol wordt gebruikt kunt u het eerste uur na de behandeling een gevoel van dronkenschap ervaren

### Vragen

Als u voorafgaand aan uw behandeling medisch inhoudelijke vragen heeft óf vragen heeft over bijwerkingen na een behandeling anders dan genoemd in de folder, dan kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van Nocepta op maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur ☎ 088-708 7060.

Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30-12:00 uur en van 13:00-15:30 uur op ☎ 088-708 5080.

Anesthesiologen-pijnspecialist

**E.H. Gensen-Alblas**

**M. Hanje**

**F.A.J. Klaassen**

**N.P. Monteiro de Oliveira**

**M.A. Richardson**

BIG-nummer

49060674401

19051845201

19049907901

29913238101

09062515801

Anesthesiologen-pijnspecialist

**C. Robers**

**A.C.W. Setz**

**M.A.M. Simon**

**Dr. M. Uslu**

BIG-nummer

19023503301

69048621701

79023879401

29059938001

Physician assistant

**M. Wijnstra**

**E. Benneker**

**R. ter Riet**

Verpleegkundig specialist

**Mw. S. de Gooijer**

BIG-nummer

79050319581

09017103381

89930799581

49017101130