

Trombolyse

Lysis

Er is in overleg met u besloten dat u een trombolysebehandeling moet ondergaan. Deze behandeling is gekozen omdat er bij u sprake is van een afsluiting van een (slag-)ader of bypass als gevolg van een bloedstolsel. Bij trombolyse wordt er een medicijn toegediend dat in staat is bloedstolsels op te lossen. In deze folder leest u over de oorzaak van uw klachten, de behandeling, de nazorg en het ontslag.

De aandoening

Als gevolg van de afsluiting in uw bloedvaten stroomt er minder bloed naar de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn. Hierdoor krijgen deze weefsels minder bloed en dus minder zuurstof. Dit veroorzaakt pijn, maar kan bij een acute afsluiting ook gevoelloosheid, witverkleuring of onvermogen om vingers of tenen goed te bewegen, veroorzaken.

Vorbereiding op de behandeling

Voorafgaand aan deze behandeling, moet u enkele uren nuchter zijn. Afhankelijk van de tijd, mag u nog een licht ontbijt nuttigen. De specifieke afspraken worden vooraf met u besproken. Er wordt een infuusnaaldje ingebracht waarop een infuus kan worden aangesloten.

Gebruikt u medicatie dan kan het zijn dat u deze voorafgaand aan de operatie moet stoppen. Dit verschilt per persoon, per behandeling. Bepreek met uw medisch specialist wat voor uw situatie van toepassing is.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog en vindt plaats via de lies. Uw huid wordt plaatselijk verdoofd waarna uw liesslagader wordt aangeprikt en een werkbuisje wordt ingebracht. Door dit werkbuisje worden katheters en materialen ingebracht die nodig zijn voor de behandeling. Er wordt contrastmiddel ingespoten om foto's te kunnen maken van

uw bloedvaten. Dit noemt men een angiografie.

Op deze manier kan de afsluiting in uw slagader goed in beeld worden gebracht. De radioloog zal een katheter achterlaten in de slagader waar de afsluiting zich bevindt. Via deze katheter worden continue twee medicijnen toegediend. Het ene medicijn moet het stolsel oplossen, het andere houdt het bloed dun.

Deze medicijnen vergroten het risico op bloedingen. Hierom wordt u opgenomen op de intensive care. Hier wordt met behulp van een monitor uw bloeddruk, hartslag en hartritme regelmatig gecontroleerd. De katheter blijft gedurende uw verblijf op de intensive care in de slagader zitten.

- U heeft bedrust gedurende de hele behandeling. Uw hoofdsteen mag iets omhoog.
- U mag het been waarin de katheter zich bevindt, niet bewegen. Hiermee voorkomt u dat de katheter gaat knikken.

Tijdens de behandeling en uw verblijf op de intensive care zal de radioloog controleren of de afsluiting reageert op de toegediende medicijnen. Dit wordt gecontroleerd door middel van het maken van een controle angiografie. Het is vooraf niet duidelijk hoe vaak een controle nodig is. Iedere afsluiting is anders en iedereen reageert anders op de medicatie. De radioloog bepaalt of de behandeling gestopt kan worden en brengt de chirurg hiervan op de hoogte. De chirurg

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

bespreekt met u het verloop van de behandeling.

Na de behandeling

Wanneer de behandeling wordt gestopt, verwijdert de radioloog de katheter uit uw lies. Het wondje in de lies wordt stevig dichtgedrukt, waarna een drukverband wordt aangelegd. Dit drukverband moet in ieder geval tot de volgende dag blijven zitten omdat uw bloed verdund is. De eerste uren na het verwijderen van de katheter heeft u nog platte bedrust, hierna mag de hoofdsteen iets omhoog.

Wanneer de katheter verwijderd is, mag u over naar de gewone verpleegafdeling waar u nog een tot enkele dagen zal verblijven. Hoeveel dagen is afhankelijk van uw situatie.

Weer naar huis

Bij deze operatie is het raadzaam om vooraf na te gaan of u thuis voorbereidingen dient te treffen voor uw thuiskomst. Heeft u bepaalde hulpmiddelen nodig? Zo ja, welke? Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen bij tillen en huishoudelijk werk?

Indien u met ontslag mag, zal een afspraak voor u worden gemaakt voor controle op de polikliniek. Deze krijgt u met de post thuis gestuurd.

Risico's/complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties/bijwerkingen optreden. Om de kans daarop te verkleinen, worden er indien nodig voorzorgsmaatregelen genomen. Specifieke complicaties/bijwerkingen bij deze behandeling zijn:

- Er kan een allergische reactie ontstaan op het contrastmiddel, wanneer u overgevoelig blijkt te zijn voor jodium. Indien u bekend met overgevoeligheid voor jodium, is het van belang dat u dit doorgeeft aan uw behandelend specialist.

- Er kan een bloeding in een ander deel van het lichaam of bij de wond in de lies ontstaan.
- U kunt last krijgen van misselijkheid, braken en hoofdpijn.

Nazorg thuis

Om de kans op complicaties te verminderen adviseren wij u om:

- De eerste 4 dagen na de behandeling geen bad te nemen en niet te zwemmen. U mag wel douchen.
- Aangepaste activiteiten gedurende 3-4 dagen te doen: niet persen, niet bukken, zo min mogelijk de trap op- en afdaan. Niet zwaarder tillen dan 5 kilo.

Ontslag

Indien u met ontslag mag, zal een afspraak voor u worden gemaakt voor controle op de polikliniek. Deze krijgt u met de post thuis gestuurd.

Na de behandeling neemt u bij problemen of een van onderstaande klachten contact op met het secretariaat vaatchirurgie tijdens kantooruren telefoonnummer 088 708 52 43. Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Neem contact op indien:

- U koorts krijgt ($38,5^{\circ}\text{C}$ of hoger).
- De lies erg pijnlijk is.
- Er een zwelling in de lies optreedt.
- De lies rood verkleurt en erg warm wordt.
- Uw been gevoelloos of pijnlijk aanvoelt.

Tot slot

Deze brochure is een aanvulling op het gesprek met de hulpverlener en is niet bedoeld als vervanging van het gesprek. In deze folder kunt u alle informatie nog eens rustig nalezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan uw behandelend specialist stellen. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.