

Stellatum proefblokkade

Wat is een stellatum proefblokkade

De stellatum proefblokkade is een behandeling waarbij een ontstekingsremmend middel wordt ingespoten in de hals. De injectie wordt gegeven ter hoogte van een zenuwknoop (= een plaats waar meerdere zenuwen bij elkaar komen). Het doel van de behandeling is pijnvermindering.

De behandeling wordt toegepast bij zenuwpijn in de onderkaak, nek, schouder, borst en/of arm en soms bij een sympathische reflexdystrofie van de arm.

Het woord "stellatum" is de medische term die verwijst naar de zenuwknoop in de hals. "Blokade" geeft aan dat de pijn als het ware "geblokkeerd" wordt.

Bij pijnvermindering wordt u op de wachtlijst geplaatst voor een definitieve stellatumblokkade.

Voor de behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wanneer u vroeg aan de beurt bent mag u een licht ontbijt (kopje thee met een beschuit).

Bent u later aan de beurt, dan mag u normaal eten. Wat voor u van toepassing is, bespreken we met u wanneer we de afspraak maken.

Belangrijk om te melden

Neemt u altijd vóór de behandeling contact op met de polikliniek voor pijnbestrijding, als één van de onderstaande zaken op u van toepassing zijn en u deze nog niet heeft besproken met de pijnbehandelaar.

Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

- gebruik van bloedverdünnende medicijnen (bijvoorbeeld Sintrom, Ascal, Marcoumar, Acetylsalicylzuur, Plavix etc.)
De assistente van de polikliniek voor pijnbestrijding zal met u afspreken,

wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

- een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling worden röntgenstralen gebruikt. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
- Suikerziekte
- overgevoeligheid voor jodium, medicijnen, contraststof of pleisters

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de hoofdingang van het ZGT.

Van daaruit gaat u naar de dagbehandeling. (dagbehandeling).

De behandeling vindt plaats in een speciale behandelkamer op de operatieafdeling.

In de behandelkamer zijn naast de behandelend arts ook nog een verpleegkundige en een röntgenlaborant aanwezig.

De verpleegkundige zorgt ervoor dat u de juiste houding aanneemt op de behandeltafel of in bed.

Daarna zal de arts nauwkeurig de juiste plaats voor de behandeling bepalen.

Vervolgens spuit de arts een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel in.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 15 - 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling. Hier moet u nog een half uur blijven liggen.

Enkele weken na de behandeling krijgt u thuis een contole afspraak toe gestuurd.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen zich na een stellatum proefblokkade voordoen:

- na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wazig zien en het ooglid kan wat afhangen. Dit is van tijdelijke aard en duurt meestal een dag.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeditstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.
- Heesheid, dit is van tijdelijke aard.
- Slikklachten, deze zijn van kortdurende aard.
- Loopneus, dit is onschuldig.
- Bij het prikken kan het longvlies geraakt worden waardoor een klaplong ontstaat. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Ondanks dat bestaat er een geringe kans op deze complicatie.

Vervoer

Omdat u tijdens de behandeling medicijnen krijgt toegediend, mag u de eerste 24 uur niet zelfstandig een auto besturen. Ook fietsen is om dezelfde reden niet toegestaan. Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U mag dan ook weer douchen en/of baden.

Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiten).

Pas na zes tot acht weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. In een aantal gevallen moet de behandeling herhaald worden.

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de assistente van de polikliniek voor pijnbestrijding. Zij is van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 tot 12.00 uur bereikbaar tussen 13.00 tot 17.00 uur en vrijdag 08.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 088 708 50 80.