

Oorcorrectie

Het afstaan van oorschelpen is een aangeboren afwijking. De afstand van de rand van de oorschelp tot het hoofd is dan te groot. Dit kan enkelzijdig en dubbelzijdig voorkomen. Soms gaat het alleen om de bovenzijde van het oor. Het is altijd een gevolg van een abnormale vorm van het kraakbeen. Een flapoor kenmerkt zich door het ontbreken van de normale plooi in het kraakbeen. Dit is operatief te corrigeren.

De operatie

De ingreep vindt meestal onder narcose plaats, maar kan bij volwassenen of oudere kinderen ook goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. In het geval van algehele anesthesie gebeurt het in een dagbehandeling. Bij plaatselijke verdoving volstaat een poliklinische behandeling. Via een huidsnede aan de achterzijde van de oorschelp wordt de spanning van het kraakbeen door insnijdingen zodanig verminderd dat de oren na afloop van de procedure dicht bij het hoofd blijven staan. De oren worden in deze stand gefixeerd door een zogenaamd tulbandverband dat we rondom het hoofd aanbrengen.

Na de operatie

De plastisch chirurgie geven de voorkeur aan het gebruik van oplosbare hechtingen. Het voordeel is dat deze niet verwijderd hoeven te worden, maar soms duurt het wel een paar weken voordat ze oplossen.

Het is van groot belang dat het verband gedurende ongeveer een week blijft zitten, waarna het op de polikliniek wordt verwijderd. De afspraak hiervoor krijgt u mee. De oren zijn na een week nog wat gezwollen en soms blauw verkleurd. Soms schuift het tulbandverband van het hoofd af. Neem dan contact met de polikliniek zodat we het eventueel opnieuw kunnen verbinden.

Na het polikliniekbezoek moeten de oren nog twee weken gedurende dag en nacht worden gesteund met een haarband.

Of met een zweetband zoals gebruikt wordt door sporters. U mag uw haren wassen, maar spoelt u het wel goed na.

Daarna moet de haarband nog twee weken 's nachts worden gedragen.

De pijnmedicatie wordt door de arts voorgeschreven bij ontslag uit het ziekenhuis.

De zwelling verdwijnt in enkele weken en na ongeveer drie maanden kan van een eindresultaat worden gesproken. De meeste patiënten hebben weinig last van de operatie en van de periode daarna. Gedurende de eerste winterperiode na de operatie kan kou als pijnlijk worden ervaren. Na een jaar komen deze klachten meestal niet meer voor.

Risico's/complicaties

Complicaties zoals een bloedingstoring of infectie komen gelukkig weinig voor.

We proberen de oren zo symmetrisch mogelijk te maken. Maar 100% symmetrie is niet mogelijk.

Contact

Bij vragen of problemen kunt u tijdens kantooruren (8.00 tot 16.30 uur) contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie via telefoonnummer: **088 708 52 45**

Bij complicaties buiten kantooruren kunt u bellen met ZGT (**088 708 78 78**) en u laten doorverbinden met de spoedeisende eerste hulp.

Almelo

Zilvermeeuw 1
 Postbus 7600
 7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
 Postbus 546
 7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt