

Marcaïnisatie

Uw medisch specialist heeft u verwezen voor een marcaïnisatie. Bij dit onderzoek spuiten we medicijnen in het gewricht om de pijn te verlichten of om er achter te komen waar de pijn vandaan komt.

Uw behandelend specialist heeft u voor het maken van foto's verwezen naar de afdeling radiologie (röntgen). Dit is een afdeling waar radiologen, arts-assistenten, physician assistants en radiodiagnostisch laboranten met behulp van verschillende technieken, afbeeldingen van het lichaam maken. Bij het maken van foto's wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze stralen kunnen verschillende delen in het lichaam zichtbaar maken en geven daarvan een afbeelding op een beeldscherm. Nadat de foto's gemaakt zijn, worden deze door een radioloog beoordeeld.

Melden

Wilt u zich voor de afgesproken tijd melden bij de balie van de afdeling radiologie? De baliemedewerker verwijst u naar de juiste wachtruimte. Neemt u een identiteitsbewijs mee?

Verhinderung

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op. U vindt de contactgegevens onderaan deze folder.

Waarschuwingen

Bij behandelingen met straling zijn mogelijke risico's verbonden, meld het daarom altijd bij uw arts wanneer u (mogelijk) zwanger bent, dan kan er een afweging gemaakt worden van deze risico's en de beste behandeling gekozen worden.

Vorbereiding

Voor het maken van deze röntgenfoto's is geen voorbereiding nodig.

Medicijnen

Indien u pijnstillers slikt, is het de bedoeling dat u deze de dag voor en op de dag van de behandeling niet meer inneemt. Tenzij de orthopeed specifiek pijnstillers meegeeft rondom deze periode. Overige medicijnen kunt u op de gebruikelijke manier innemen.

Wanneer u op de afgesproken datum antibiotica gebruikt, kan de afspraak niet doorgaan.

Eerst de antibioticakuur helemaal afmaken. Hierna kunt u een nieuwe afspraak maken.

Verloop van het onderzoek

De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtruimte en neemt u mee naar de kleedkamer. Bij het maken van een foto is het belangrijk dat het lichaamsdeel waar het om gaat zo min mogelijk door kleding wordt bedekt. De radiodiagnostisch laborant zegt u welke kleding u uit moet doen. U komt op een onderzoekstafel te liggen. De plaats van de punctie wordt ontsmet met een desinfectiemiddel. Via een injectie krijgt u contrastvloeistof, verdoving en eventueel een ontstekingsremmer in het gewricht. De naald wordt vervolgens verwijderd en er zullen röntgenopnamen gemaakt worden.

Bijwerkingen en overig

Als bijwerking van het ingespoten medicijn kan er een tijdelijke stoornis in de hormoonhuishouding optreden zoals een verstoord menstratiepatroon. Ook vrouwen in de overgang kunnen plotseling weer gaan menstrueren. Mensen met diabetes mellitus moeten de eerste 48 uur na behandeling de bloedsuikers vaker controleren. Het kan zijn dat er een grotere behoefte aan insuline of

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

orale antidiabetica is.

Een rood gelaat, hoofdpijn en hartkloppingen kunnen ook voorkomen.

U mag na het onderzoek **niet** autorijden

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen, neem dan contact op met de afdeling radiologie.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: www.zgt.nl/mijnzgt.