

Lokale infiltratie

Wat is een lokale infiltratie

Een lokale infiltratie is een vorm van pijnbestrijding, waarbij de arts via de huid een injectie met een verdovende vloeistof en ontstekingsremmer geeft. De verdovende vloeistof schakelt de zenuw uit. Deze injectie wordt gegeven als een geïrriteerde zenuw pijn veroorzaakt, of als er na een operatie pijn in een litteken bestaat.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van de hoofdingang van ZGT locatie Hengelo. Van daaruit gaat u naar de verpleegunit A1 (dagbehandeling). De behandeling vindt plaats in een speciale behandelkamer op de operatie afdeling. In de behandelkamer zijn naast de behandelend arts ook nog één of twee verpleegkundigen aanwezig. De verpleegkundige helpt u in de juiste houding voor de behandeling. Komen uw klachten van een geïrriteerde zenuw, dan zal de arts met behulp van een zenuwstimulator de juiste plaats bepalen. U moet hierbij dan aangeven of het dezelfde pijn is die u thuis voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd krijgt u een injectie met een verdovende vloeistof. Dit geeft een branderig gevoel en kan even pijnlijk zijn. Daarna vindt de lokale infiltratie plaats met een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmer. Hiervoor wordt meestal dezelfde naald gebruikt, u krijgt dus geen extra prik. Bestaan uw klachten van pijn rondom een operatielitteken, dan vraagt de arts of u de plaats kunt aanwijzen met één vinger. Vervolgens zal de pijnlijke plaats geïnfiltreerd worden.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 10 – 15 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar dagbehandeling.

Risico's en/of bijwerkingen

Aan deze behandeling zijn geen belangrijke risico's verbonden.

Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk:

- Als u een middel is toegediend dat de zwelling van de zenuw vermindert, krijgt u soms last van een rood gezicht of kunt u vocht vasthouden. Dit duurt niet langer dan enkele dagen
- Bij vrouwen is de menstruatiecyclus wel eens onregelmatig. Dit is niet verontrustend en slechts van tijdelijke aard.
- Extra controle bij diabetes mellitus mogelijk verhoogt bloedsuiker.

Resultaat

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer zes uur, waarna de pijn kan terugkeren.

De pijn is dan vaak minder hevig. Het middel ter vermindering van de zwelling van de zenuw begint pas na tien tot veertien dagen te werken.

Voor een blijvend resultaat is het soms nodig om de injectie te herhalen. Door de zenuwtakjes telkens weer te verdoven, registreren ze op den duur geen pijn meer. Soms verlopen de behandelingen zonder het gewenste resultaat. De arts overlegt dan met u of er een andere behandeling mogelijk is. Pas na zes tot acht weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Vervoer

U mag de eerste 24 uur niet zelfstandig een auto besturen. Ook fietsen is om dezelfde reden niet toegestaan.

Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en/of baden.

Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze pijn kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter).

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerst volgende menstruatie niet meer betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de assistente van pijncentrum Nocepta. Zij is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00 en 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 708 50 80.