

Iontoforese

Wat is Iontoforese?

Iontoforese is een behandeling, waarbij via de huid van het aangedane lichaamsdeel een medicijn wordt ingebracht. Dit gebeurt met behulp van een "medicijnpleister" en een elektrisch veld. Iontoforese bevordert de doorbloeding.

De afspraak

In de meeste gevallen zal de arts zelf met u afspreken wanneer u voor de behandeling kunt komen. Zo niet, dan zal de assistente van de polikliniek voor pijnbestrijding de afspraak met u maken.

Voor de behandeling

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn.

Ook eventuele bloedverdünnende middelen (Ascal, Sintrom, Plavix, Fenprocoumon, Marcoumar enzovoort) hoeft u niet te staken.

Belangrijk om te melden

Neemt u altijd vóór de behandeling contact op met de polikliniek voor pijnbestrijding als één van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de arts. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

- Een bijniertumor;
- Hartklachten door een hoge bloeddruk.
- Hartritme stoornissen.
- Een pacemaker.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie in de hal bij de hoofdingang. Daarna gaat u naar de dagbehandeling.

U neemt plaats op een brancard. Uw arm wordt op een kussen op uw schoot gelegd. Als de behandeling aan uw been of voet plaatsvindt, dan wordt hier een kussen onder geplaatst. De huid wordt ontsmet. Vervolgens

wordt er een plaatje (elektrode) en een medicijnpleister op de huid geplakt. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren, wordt het medicijn vanuit de pleister via de huid in het lichaam opgenomen. Tijdens de behandeling kan de huid onder de pleister prikkend of branderig aanvoelen.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u direct naar huis. Na een proefperiode van vier tot zes behandelingen, vindt er een evaluatie plaats met de arts. Meestal wordt u de eerste vier weken één à tweemaal per week behandeld.

Wanneer de iontoforese niet aanslaat, kan nog overgegaan worden op een andere behandelvorm. Dit zal altijd in overleg gaan met uw behandelend arts.

Complicaties

Roodheid van de huid op de plaats waar de pleisters/elektroden hebben gezeten is mogelijk na deze behandeling.

Vervoer

De dag van behandeling mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Regel dus vooraf uw vervoer.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de assistente van pijncentrum Nocepta. Zij is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-708 50 80.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt