

Intercostaal blokkade

Inleiding

U hebt met uw arts afgesproken dat u voor de pijnklachten over de ribben of in de buikwand in aanmerking komt voor een verdoving van een tussenribszenuw (intercostaalblokkade). In deze folder vindt u informatie over de therapie, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.

Algemeen

Voor deze behandeling wordt u een paar uur opgenomen op de dagbehandeling van het ziekenhuis. U mag op de dag van de behandeling gewoon eten, tenzij de arts anders voorschrijft. U meldt zich op de afgesproken tijd bij de dagbehandeling. U wordt in uw bed naar de behandelkamer gebracht waar u moet overstappen op een behandeltafel. Na afloop van de behandeling wordt u weer teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling waar u koffie of thee aangeboden krijgt. Ongeveer een half uur tot een uur na de behandeling mag u naar huis. U krijgt een controleafspraak voor de polikliniek pijnbestrijding mee.

Behandeling

U ligt voor deze behandeling op uw buik op de behandeltafel. Uw arts zal onder röntgendoorlichting een naald plaatsen juist onder de rib waar de tussenribszenuw loopt. De plaats van de naald wordt met een röntgencontrastmiddel gecontroleerd. Daarna wordt een lokale verdovingsvloeistof en vaak ook een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd) ingespoten. De behandeling duurt 5 tot 10 minuten. Soms moet deze behandeling op meerdere niveaus worden uitgevoerd.

Complicaties

Is er bij het prikken een bloedvatje geraakt dan kan er een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.

- Er is een geringe kans dat bij het prikken het longvlies wordt geraakt waardoor een klaplong kan ontstaan. Uw arts zal dat controleren en zondig behandelen. Ook indien u zich uren na de behandeling toenemend kortademig voelt worden moet u contact opnemen met de dienstdoende anesthesioloog via de receptie van het ziekenhuis.
- Hebt u een allergie voor contrastvloeistof, dan kunt u jeuk, huiduitslag, kortademigheid of een bloeddrukdaling krijgen. Via het infuus kan de arts u zondig meteen medicijnen toedienen om een allergische reactie tegen te gaan.

Bijwerkingen

- Door de injectie van de ontstekingsremmer kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord zijn.
- Er bestaat een zeer geringe kans op verminderde betrouwbaarheid van orale anti-conceptie ("de pil") gedurende één menstruatiecycclus.
- Patiënten met suikerziekte die insuline gebruiken, merken na toediening van de injectie soms dat hun bloedsuikers gedurende enkele dagen verhoogd zijn.

Resultaat

Het effect van de behandeling is meestal vlot na de behandeling te beoordelen. Het is echter niet goed te voorspellen hoe lang het effect zal aanhouden. In sommige gevallen zal de behandeling moeten worden herhaald. Tijdens een controle afspraak bespreekt uw arts het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://www.facebook.com/ZGTinfo)

 twitter.com/ZGT_info

 [linkedin.com/company/zgt](https://www.linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://www.youtube.com/user/ZGTinfo)

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Let op!

- Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een (mogelijke) zwangerschap in verband met de röntgenstraling.
- De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen. Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn. Regelt u zelf iemand die u naar huis brengt?
- Gebruikt u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar of Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is? Dan moet u deze tijdelijk stoppen. Uw arts spreekt met u af wanneer u dient te stoppen. Na de behandeling moeten deze medicijnen worden hervat. Neem hierover contact op met de trombosedienst zodra u de datum van behandeling weet. De trombosedienst kan u precies vertellen met welk schema u uw medicijnen moet gaan innemen.
- Gebruikt u medicijnen die als doel hebben de stolling van het bloed te beïnvloeden, dan moet u dat altijd melden aan uw arts op de polikliniek pijnbestrijding. Is het voor u niet duidelijk of u wel of niet medicatie moet stoppen voor de behandeling? Neem dan contact op met pijncentrum Nocepta (hieronder vindt u de contactgegevens).

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met pijncentrum Nocepta, telefoonnummer: 088 708 50 80. Het pijncentrum is op werkdagen 's ochtends bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van 14.00 tot 17.00 uur.