

## Coeliacusblokkade

### Inleiding

De behandeling coeliacusblokkade kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuiksorganen. Zoals de lever, de alvleesklier en de maag. Soms kan deze behandeling ook effectief zijn bij alvleesklierontsteking (pancreatitis). Het betreft een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in medische termen "plexus coeliacus" genoemd. Bij de meerderheid van de patiënten treedt na de blokkade een goede pijnverlichting op.

### Behandeling

Voor deze behandeling wordt u enkele dagen opgenomen op een verpleegafdeling van ZGT. De coeliacusblokkade wordt uitgevoerd onder verdoving: U krijgt daarvoor óf algehele narcose óf verdoving middels een ruggenprik. Uw arts bespreekt dat van tevoren met u. De behandeling duurt ongeveer een half uur. U ligt daarvoor op uw buik op de behandelafdeling. Onder röntgendoorlichting wordt zowel links als rechts een naald via de rug ingebracht. Er wordt röntgencontrastmiddel ingespoten om de positie van de naalden te controleren. Vervolgens wordt de behandelvloeistof (medicinaal-alcohol of fenol) rondom het zenuwnetwerk gespoten.

### Complicaties

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er toch een geringe kans op het optreden van complicaties.

- Hebt u een allergie voor contrastvloeistof, dan kunt u jeuk, huiduitslag, kortademigheid of een bloeddrukdaling krijgen. Via het infuus kan de arts u zonodig meteen medicijnen toedienen om een allergische reactie tegen te gaan.

- Een enkele keer kan door lekkage van de chemische vloeistof zenuwpijn optreden die in de lies en het bovenbeen voelbaar is. Na enkele weken gaat deze pijn over in een doof gevoel. Voor deze klacht kan de arts u medicijnen voorschrijven.
- Uiterst zelden kan door lekkage van de ingespoten vloeistof ook gedeeltelijke uitval van andere zenuwtakken optreden. In het uiterste geval kan een dwarslaesie optreden (gedeeltelijke verlamming van beide benen). De kans daarop is uitermate gering.

### Bijwerkingen

- Een vaak voorkomende bijwerking is het tijdelijk optreden van diarree.
- De eerste weken na de behandeling kunt u bij plots recht op komen, even duizelig zijn.

### Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas na één of twee dagen na de behandeling duidelijk. Bij de meeste patiënten treedt een goede pijnvermindering op zodat het gebruik van pijnstillers kan worden verminderd. Het effect houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zonodig herhaald worden.

### Let op!

- Informeer uw arts over medicijnen die u gebruikt en of u allergisch bent voor medicijnen als jodium, contrastmiddel, pijnstillers en antibiotica.
- Gebruikt u antistollingsmiddelen (bloedverduunners) zoals Sintrom, Acenocoumarol, Marcoumar of Fenprocoumon waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is? Dan moet u deze tijdelijk stoppen. Uw arts spreekt met u af wanneer u dient te stoppen. Na de behandeling moeten deze medicijnen worden hervat. Neem hierover contact op met de trombosedienst zodra u de datum

#### Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTinfo](https://facebook.com/ZGTinfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTinfo](https://youtube.com/user/ZGTinfo)

 [zgt.nl](mailto:zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

van behandeling weet. De trombosedienst kan u precies vertellen met welk schema u uw medicijnen weer moet gaan innemen.

- Gebruikt u medicijnen die als doel hebben de stolling van het bloed te beïnvloeden? Dan moet u dat altijd melden aan uw arts op de pijnpoli. Is het voor u niet duidelijk of u wel of niet medicatie moet stoppen voor de behandeling? Neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding (hieronder vindt u de contactgegevens).

### **Vragen**

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met pijncentrum Nocepta, telefoonnummer: 088 708 5080. Het pijncentrum is op werkdagen 's ochtends bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. En vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.