

Het verloop van de trastuzumab/ capecitabine/tucatinib kuur

U begint met een chemokuur. De kuur bestaat uit drie medicijnen.

1. Trastuzumab
2. Capecitabine
3. Tucatinib

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
T	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu
Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu						
Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca	Ca							
Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu	Tu

Uw behandelend medisch specialist heeft u een behandeling met trastuzumab-capecitabine-tucatinib voorgesteld. Deze kuur is een combinatie van chemotherapie (capecitabine) en doelgerichte therapie (trastuzumab en tucatinib).

Bij doelgerichte therapie krijgt u medicijnen om kankercellen te doden of de groei ervan te remmen. Deze medicijnen blokkeren de werking van bepaalde eiwitten van de kankercel: het her-2 eiwit. Dit eiwit zit bij bepaalde tumoren op de celwand van de kankercellen. Het zorgt ervoor dat de tumorcellen kunnen groeien. Her2-remmers blokkeren dit eiwit waardoor deze kankercellen stoppen met groeien en afsterven.

Tucatinib werkt vanuit de binnenzijde van de cel. Trastuzumab werkt vanuit de buitenzijde van de cel. Capecitabine heeft als doel de om kankercellen rechtstreeks te vernietigen.

Manier van toediening

Trastuzumab krijgt u via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT.

De toediening van trastuzumab begint langzaam en zal bij de volgende behandeling wat sneller gaan als u geen last van bijwerkingen hebt gehad. De toediening van trastuzumab duurt de eerste keer ongeveer zes uur. Vanaf de tweede kuur duurt dit ongeveer één uur.

De capecitabine en tucatinib zijn tabletten. U start met het innemen van deze tabletten op de avond van dag één. Capecitabine slikt u door tot en met de ochtend van dag 15. Tucatinib slikt u tijdens de hele behandeling twee keer per dag.

U krijgt, afhankelijk van de bloedsuitslagen, iedere drie weken deze kuur. Hoeveel kuren u krijgt ligt eraan hoe het gaat. Dit kan bij iedereen anders zijn.

Naast de algemene bijwerkingen kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

- Koorts boven de 38,5, neem dan contact met ons op.

- U kunt last krijgen van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige wanneer u vaker dan vier keer per dag diarree heeft. Zij adviseert u over een passende behandeling. Blijf alert op uw ontlastingspatroon, de behandeling van diarree kan obstipatie (verstopping) als gevolg hebben.
- U kunt last krijgen van pijn op de borst, geef dit altijd door aan de behandelend specialist, verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige
- Pijnlijke gezwollen handen en/of voeten, hiervoor kunt u viermaal daags bodylotion/handcrème of 10% ureumzalf gebruiken. Probeer knellende kleding en schoenen zoveel mogelijk te vermijden.
- Stomatitis: als de mond en/of keel pijnlijk, rood of gezwollen is of als u kapotte plekjes en zweren in de mond heeft. Goede mondverzorging en viermaal per dag spoelen met een zoutoplossing of kamille-/groene thee kan deze klachten al zoveel mogelijk voorkomen.
- Misselijkheid en verlies van eetlust. Gebruik frequent kleine maaltijden
- Braken
- Vermoeidheid
- Tijdens en het gebruik van capecitabine en tot 48uur na de laatste dosis komt een heel kleine hoeveelheid van het geneesmiddel in uw lichaamsvloeistoffen terecht, vooral in uw urine. U hoeft zelf geen speciale maatregelen te nemen. Maar voor familie en verzorgers zijn wel hygiënische voorzorgsmaatregelen nodig als zij in direct contact komen met bijvoorbeeld urine, ontlasting of braaksel. Wij raden verzorgers en naasten aan om wegwerphandschoenen te dragen bij contact met urine, ontlasting of braaksel.

Manier van inname capecitabine

- Neem de capecitabine in met een tussentijd van twaalf uur.
- Neem de capecitabine in binnen een half uur na iets gegeten te hebben.
- Slik de capecitabine zonder te kauwen in zijn geheel door met water
- Kunt u door medische redenen de tabletten niet in zijn geheel doorslikken? Dan kunnen deze tabletten worden vergruisd of opgelost. Dit kan alleen na overleg en goedkeuring door uw behandelend specialist en de apotheker.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend medisch specialist.
- Neem vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Manier van inname tucatinib

- U kunt de medicatie op hetzelfde tijdstip als de capecitabine innemen, houd er hierbij rekening mee dat capecitabine met de maaltijd, of binnen een half uur na de maaltijd ingenomen wordt. Voor tucatinib hoeft dit niet.
- Slik de tucatinib zonder te kauwen in zijn geheel door met water

- Neem de tucatinib in met een tussentijd van twaalf uur.
- Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, neem dan eerst contact op met uw behandelend medisch specialist.
- Neem een vergeten dosering niet alsnog in en verdubbel een volgende dosering niet. Volg het normale behandelingschema en stop op de oorspronkelijke stopdatum.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.