

Het verloop van de Folfoxiri / Bevacizumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vijf medicijnen.

1. Oxaliplatin
2. Irinotecan
3. Leucovorin
4. Fluorouracil
5. Bevacizumab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O I L F B	F	F											

Wijze van toediening

Het medicijn wordt toegediend via een infuus in een ader in uw hand, arm of via een Port a cath. Dit gebeurt op afdeling 5West van ZGT. U blijft voor deze kuur twee nachten opgenomen. Degene die een Port a cath heeft krijgt de eerste behandeling klinisch. De vervolgcuren kunnen vervolgens poliklinisch gegeven worden op de dagbehandeling oncologie in locatie Hengelo. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de twee weken gegeven.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar kan gaan uitvallen, mogelijk wordt het alleen dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haarausval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Voorafgaande aan de kuur krijgt u een onderhuidse injectie om bijwerkingen tegen te gaan.
- Irinotecan heeft als meest voorkomende bijwerking het optreden van diarree. Neem contact op met de oncologieverpleegkundige indien u vaker dan vier keer daags diarree heeft, zij zullen u adviseren over een passende behandeling. U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meldt dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend medisch specialist.
- Drink de eerste vijf dagen zo min mogelijk koude dranken en kleed u zo warm mogelijk aan.
- Tijdens de toediening van oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de infuus arm. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit doet zich meestal voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel.

Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken, vreemd gevoel in de tong

- Door de bevacizumab kan uw bloeddruk stijgen. Voorafgaande en aan de bevacizumab wordt daarom de bloeddruk gemeten.
- Resten cytostatica kunnen tot dag acht in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.

De bijwerkingen van de bevacizumab staan beschreven in de bijgeleverde folder.

Als u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.