

Het verloop van FOLFOX + Nivolumab kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen.

1. **F**luorouracil
2. **F**olinezuur
3. **O**xaliplatin
4. **N**ivolumab

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fo													
Fl	Fl	Fl											
O													
N													

Wijze van toediening

U krijgt medicijnen via een infuus in een ader in uw hand of arm of via een port-a-cath. Deze behandeling gebeurt in principe op de verpleegafdeling oncologie van locatie Almelo. Voor deze chemokuur wordt u twee nachten opgenomen. De volgende kuur start in principe twee weken na dag één als de bloeduitslagen goed zijn.

Heeft u een port-a-cath? Dan krijgt u de eerste behandeling op de verpleegafdeling. Verdere behandelingen krijgt u op de dagbehandeling oncologie van locatie Hengelo. Daarna krijgt u een kleine draagbare pomp die u meeneemt naar huis. Via deze pomp krijgt u de rest van uw chemokuur thuis. Na deze behandeling haalt een verpleegkundige van ThoeZ Twente deze pomp weer weg.

Naast de algemene bijwerkingen kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

- Bij koorts boven de 38.5° C moet u contact met ons opnemen.
- Uw haar valt niet uit, het kan wel wat dunner worden.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in de vingertoppen en/of tenen. Meld dit bij een volgend bezoek aan uw behandelend medisch specialist of verpleegkundig specialist.
- Drink de eerste paar dagen zo min mogelijk koude dranken en kleed u zo warm mogelijk aan.
- Tijdens de toediening van oxaliplatin kan een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan in de arm. Hiervoor krijgt u een warme doek op de arm met het infuus. Ook kunt u van huis een kruik meenemen die wij dan voor u vullen met warm water.
- Soms kan een gespannen gevoel in de keel of hals ontstaan. Dit gebeurt vaak voor tijdens of vlak na de toediening. Het verdwijnt over het algemeen vrij snel. Kenmerken zijn: moeilijk slikken of praten, benauwdheid, spanning in de kaken, vreemd gevoel in de tong

- Resten cytostatica kunnen tot dag acht in het lichaamsvocht (onder meer in urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig zijn.

De bijwerkingen van nivolumab staan in de bijgeleverde folder en waarschuwingskaart.

Als u klachten heeft die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.